

حساب دیفرانسیل و انتگرال

بخش

مفاهیم مقدماتی مشتق

مفهوم مشتق

تعريف مشتق: فرض کنید f در یک همسایگی نقطه‌ی a تعریف شده باشد. در این صورت اگر حد زیر موجود باشد، می‌گوییم تابع f در $x = a$ مشتق‌پذیر است. مشتق تابع f در $x = a$ که آن را با $f'(a)$ نشان می‌دهیم برابر است با:


$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

با تبدیل h به $a - x$ ، به تعریف دیگری از مشتق می‌رسیم. در این حالت اگر $\rightarrow h$, آن‌گاه $\rightarrow a - x$. بنابراین داریم:


$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

مشتق تابع $y = f(x)$ بر حسب x را به صورت‌های $(x, f'(x), y'_x)$, y'_x , $D_x(y)$ و یا به شکل ساده‌ی y' نمایش می‌دهند.


تعییر هندسی مشتق: خطی که از نقطه‌ی A و نقطه‌ی دیگری مانند B_1 و B_2 می‌گذرد را در نظر بگیرید. به این خط، خط قاطع می‌گوییم. شیب خط قاطع AB برابر با $m_{AB} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ است. طرف راست این تساوی را خارج قسمت تقاضایی می‌نامیم. هنگامی که B_1 روی منحنی به سمت A حرکت می‌کند، h به سمت صفر می‌کند. در این حالت می‌گوییم خط به دست آمده بر نمودار مماس است و شیب آن برابر $f'(a)$ می‌باشد.



تعريف خط مماس: اگر f بر بازه‌ی بازی شامل a تعریف شده و $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ موجود باشد، آن‌گاه خطی که از نقطه‌ی $(a, f(a))$ گذشته و دارای شیب m می‌باشد، خط مماس بر نمودار f در نقطه‌ی $(a, f(a))$ نامیده می‌شود.



همچنین اگر f در a پیوسته بوده و $\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right| = +\infty$ خط مماس قائم بر نمودار f است. مانند شکل مقابل:



توجه داشته باشید اگر f در بازه‌ی $[a, b]$ پیوسته باشد، تعریف خط مماس قائم را می‌توان به نقاط انتهایی a و b نیز تعمیم داد. برای مثال در معادله‌ی نیم‌دایره $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ با توجه به نمودار آن، خطوط $x=1$ و $x=-1$ ، خطوط مماس قائم بر منحنی $f(x)$ هستند.

قضیه: اگر تابع f در نقطه‌ی a مشتق‌پذیر باشد، آن‌گاه در این نقطه پیوسته است.

عكس قضیه‌ی بالا صحیح نیست، یعنی ممکن است تابع پیوسته باشد، اما مشتق‌پذیر نباشد. به عبارت دیگر پیوستگی تابع در $x = a$ شرط لازم برای مشتق‌پذیری تابع است نه شرط کافی.

نتیجه: اگر تابع f در a ناپیوسته باشد، آن‌گاه در a مشتق‌ناپذیر است.

مشتق‌های یک‌طرفه

تعريف مشتق راست: اگر تابع f در بازه‌ی $[a, b]$ تعریف شده باشد، حد زیر را در صورت وجود، مشتق راست f در نقطه‌ی a می‌نامیم:

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{یا} \quad f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

تعريف مشتق چپ: اگر تابع f در بازه‌ی $[a, b]$ تعریف شده باشد، حد زیر را در صورت وجود، مشتق چپ f در نقطه‌ی a می‌نامیم:

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{یا} \quad f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

نکته: شرط لازم برای مشتق راست، پیوستگی راست و شرط لازم برای مشتق چپ، پیوستگی چپ است.

تعريف مشتق‌پذیری در نقطه‌ی درونی a : تابع f در نقطه‌ی درونی a مشتق‌پذیر است، هرگاه در این نقطه، مشتق چپ و راست با هم مساوی و برابر یک عدد حقیقی معین باشند. یعنی:

تعريف مشتق‌پذیری در نقطه‌ی انتهایی دو سر بازه: اگر تابع f روی بازه‌ی $[a, b]$ تعریف شده باشد، آن‌گاه f در $x = a$ مشتق‌پذیر است، هرگاه در این نقطه مشتق راست داشته باشد و در $x = b$ مشتق‌پذیر است، هرگاه در این نقطه مشتق چپ داشته باشد. به عبارت بهتر، اگر f فقط در یک همسایگی چپ یا راست نقطه‌ای تعریف شده باشد، منظور از مشتق تابع در آن نقطه، مشتق یک طرفه‌ی آن می‌باشد.

تعییر هندسی مشتق‌پذیری در نقطه‌ی درونی a : تابع f در نقطه‌ی درونی a مشتق‌پذیر است، هرگاه در این نقطه بتوان یک خط کامل مماس و غیرموازی با محور y را بر منحنی رسم کرد.

تعییر هندسی مشتق‌های چپ و راست: اگر $(a, f'_+(a))$ موجود باشد، آن‌گاه منظور از $f'_+(a)$ ، شیب مماس راست و اگر $(a, f'_-(a))$ موجود باشد، منظور از $f'_-(a)$ شیب مماس چپ در نقطه‌ی a می‌باشد. (مماس راست، خطی است که به شاخه‌ی سمت راست f در نقطه‌ی a مماس شده و مماس چپ، خطی است که به شاخه‌ی سمت چپ f در نقطه‌ی a مماس شده است.)

$$\begin{aligned} \text{مماس راست} &= f'_+(a) \\ \text{شیب مماس راست} &= f'_+(a) \\ \text{شیب مماس چپ} &= f'_(a) \end{aligned}$$

پیوستگی تابع مشتق: اگر تابع مشتق f در نقطه‌ی a پیوسته باشد، آن‌گاه حد مشتق f با مقدار مشتق f در a برابر است، یعنی:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$$

قضیه ۱: اگر f روی بازه‌ی $[a, b]$ پیوسته و در بازه‌ی (a, b) مشتق‌پذیر باشد، آن‌گاه: $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ موجود باشد و $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ مشتق‌پذیر باشد و $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ تعريف شود، آن‌گاه:

قضیه ۲: اگر f روی بازه‌ی $[b, a]$ پیوسته و در بازه‌ی (b, a) مشتق‌پذیر باشد و $\lim_{x \rightarrow a^-} f'(x)$ موجود باشد، آن‌گاه:

مشتق‌های یک طرفه در توابع چندضابطه‌ای

برای پیدا کردن مشتق‌های چپ و راست، در نقاط مرزی توابع چندضابطه‌ای، می‌توانیم از تعریف مشتق استفاده کنیم. اما گاهی اوقات استفاده از فرمول‌های مشتق‌گیری راحت‌تر است. ولی در این روش حتماً باید به پیوستگی تابع توجه کرد.

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) \quad \begin{cases} g(x) & x > a \\ L & x = a \\ h(x) & x < a \end{cases}$$

در تابع چندضابطه‌ای $x = a$ اگر تابع f در $x = a$ پیوستگی راست داشته باشد و $g(a)$ تعريف شود، آن‌گاه:

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) \quad \begin{cases} \text{تعريف شود، آن‌گاه: } h(a) & x = a \\ \text{چپ داشته باشد و } h(a) & x < a \end{cases}$$

پس به‌طور کلی برای پیدا کردن تابع مشتق توابع چندضابطه‌ای، ابتدا مشتق هر یک از ضابطه‌ها را محاسبه کرده و اگر تابع در نقطه‌ی مرزی مشتق‌پذیر نباشد، تساوی را در آن نقطه‌ی مرزی حذف می‌کنیم. اما اگر تابع در نقطه‌ی مرزی مشتق‌پذیر باشد، در یک ضابطه‌ی جداگانه آن را مشخص می‌کنیم.

مثال ۱: اگر $f(x) = \begin{cases} 2x^3 - x ; & x \leq 2 \\ x^3 - 2 ; & x > 2 \end{cases}$ باشد، مشتق‌پذیری f را در $x = 2$ بررسی کنید و در صورت وجود، f'_+ و f'_- را تعیین نمایید.

پاسخ: ابتدا بدون در نظر گرفتن نقطه‌ی مرزی $x = 2$ از دو ضابطه مشتق می‌گیریم، سپس وضعیت مشتق را در $x = 2$ بررسی می‌کنیم:

$$f'(x) = \begin{cases} 4x - 1 ; & x < 2 \\ 3x^2 ; & x > 2 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = 7, \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = 12$$

تابع در $x = 2$ پیوسته است. بنابراین: $f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = 7$ و $f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = 12$ چون $f'_-(2) \neq f'_+(2)$ پس در $x = 2$ مشتق وجود ندارد.

مثال ۲: اگر $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x ; & x \leq 2 \\ x^2 + 3x - 4 ; & x > 2 \end{cases}$ باشد، مشتق‌پذیری f را در $x = 2$ بررسی کنید و در صورت وجود، f'_+ و f'_- را تعیین نمایید.

$$f'(x) = \begin{cases} 4x - 1 ; & x < 2 \\ 2x + 3 ; & x > 2 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = 7, \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = 7$$

تابع در $x = 2$ پیوسته است. بنابراین: پس تابع f در $x = 2$ مشتق‌پذیر است و تابع مشتق آن به صورت زیر می‌باشد:

$$f'(x) = \begin{cases} 4x - 1 ; & x < 2 \\ 7 & x = 2 \\ 2x + 3 ; & x > 2 \end{cases}$$

مثال ۳: اگر $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x ; & x \leq 2 \\ x^2 + 3x ; & x > 2 \end{cases}$ باشد، مشتق‌پذیری f را در $x = 2$ بررسی کنید و در صورت وجود، f'_+ و f'_- را تعیین نمایید.

$$f'(x) = \begin{cases} 4x - 1 ; & x < 2 \\ 2x + 3 ; & x > 2 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = 7, \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = 7$$

تابع در $x = 2$ پیوستگی چپ دارد. بنابراین:

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = 7$$

$$f'_+(2) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x)$$

تابع در $x = 2$ پیوستگی راست ندارد، بنابراین $f'_+(2)$ موجود نیست:
چون $f'_+(2)$ موجود نیست، پس تابع در $x = 2$ مشتق‌نایاب است.

ریاضی خارج ۹۲

$$\text{تسنیع: در تابع با ضابطه‌ی } f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{x} & ; x \geq 1 \\ x^2 + ax + b & ; x < 1 \end{cases} \text{ کدام است؟}$$

$$3 - 2\sqrt{2} \quad (4)$$

$$2 - 2\sqrt{2} \quad (3)$$

$$2 - \sqrt{2} \quad (2)$$

$$3 - \sqrt{2} \quad (1)$$

پاسخ: تابع در $x = 1$ مشتق‌بزیر است، پس در $x = 1$ پیوسته می‌باشد:

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + \frac{1}{x^2} & ; x > 1 \\ 2x + a & ; x < 1 \end{cases} \quad f'_+(1) = f'_-(1) \Rightarrow 1 + 1 = 2 + a \Rightarrow a = 0 \xrightarrow{a+b=-1} b = -1 \Rightarrow f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{x} & ; x \geq 1 \\ x^2 - 1 & ; x < 1 \end{cases}$$

چون $1 - \sqrt{2} < 1$ می‌باشد، پس برای محاسبه‌ی $f(1 - \sqrt{2})$ از ضابطه‌ی پایین استفاده می‌کنیم:
بنابراین گزینه‌ی (۳) صحیح است.

تذکر: در این بخش، ممکن است به سؤال‌های حدی برخورد کنیم که معمولاً به کمک تعریف مشتق، می‌توان به آن‌ها پاسخ داد. ولی ما ترجیح می‌دهیم، در صورت برقراری شرایط اگر به حالت مبهم $\frac{0}{0}$ رسیدیم، از قضیه‌ی هوپیتال استفاده کنیم.

$$\text{تسنیع: اگر } f(x) = \begin{cases} x^2 - x & ; x \geq 2 \\ 2\cos(x-2) & ; x < 2 \end{cases} \text{ کدام است؟}$$

$$-36 \quad (4)$$

$$24 \quad (3)$$

$$-36 \quad (2)$$

$$-24 \quad (1)$$

پاسخ: حاصل حد به صورت $\frac{0}{0}$ در می‌آید، پس می‌توانیم از قاعده‌ی هوپیتال استفاده کنیم:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h^2) - f(2+2h^2)}{h^2} \stackrel{\overset{\circ}{\text{مهم}}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(-2h)f(2-h^2)f'(2-h^2) - 2(4h)f(2+2h^2)f'(2+2h^2)}{2h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (-2f(2-h^2)f'(2-h^2) - 4f(2+2h^2)f'(2+2h^2)) = -2f(2^-)f'_-(2) - 4f(2^+)f'_+(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 ; f'(x) = \begin{cases} 2x - 1 & ; x > 2 \\ -2\sin(x-2) & ; x < 2 \end{cases} \Rightarrow f'_+(2) = 4 - 1 = 3 , f'_-(2) = -2(0) = 0$$

$$\Rightarrow -2f(2^-)f'_-(2) - 4f(2^+)f'_+(2) = 0 - 4(2)(3) = -24$$

بنابراین گزینه‌ی (۱) صحیح است.

نقاط مشتق نایاب

نقاط مشتق‌نایاب معمولاً در تابع نایپوسته، اصم، قدرمطلقی، براکتی و چندضابطه‌ای وجود دارند. نقاط مشتق‌نایاب را به صورت زیر دسته‌بندی می‌کنیم:



۱- نقاط نایپوسته: تابع در نقاط نایپوسته، مشتق‌نایاب است و از دید هندسی در این نقاط، نمی‌توان یک خط کامل مماس بر منحنی رسم کرد.

۲- مثال: نقاط مشتق‌نایاب $[x] = f(x)$ را بنویسید، سپس نمودار تابع $f(x)$ و $f'(x)$ را رسم کنید. (نماد جزء صحیح می‌باشد).

پاسخ: $f(x) = [x]$ در نقاط صحیح نایپوسته و مشتق‌نایاب است و در نقاط غیرصحیح روی خط افقی $y = k$ قرار می‌گیرند که مشتق تابع در آن‌ها برابر صفر است.

۳- نکته: تابع به شکل کلی $[f(x)] = y$ در تمام نقاطی که پیوسته هستند، مشتق‌نایاب می‌باشند و مقدار مشتق آن‌ها صفر است. به عبارت بهتر در نقاط مشتق‌نایاب $f'(x) = 0$ می‌باشد و در نقاط نایپوسته مشتق‌نایاب هستند.

۴- نقاط زاویه‌دار (گوشه): نقاطی هستند که تابع در آن‌ها پیوسته بوده و مشتق چپ و راست در آن‌ها دو عدد حقیقی نابرابر است (یا یکی عدد و دیگری بی‌نهایت است). از دید هندسی در این نقاط یک مماس چپ و یک مماس راست بر منحنی رسم می‌شود که با هم زاویه می‌سازند. مانند شکل روبرو:




می‌شود که با هم زاویه می‌سازند. مانند شکل روبرو:

۵- مثال: مشتق‌پذیری تابع $|x^3 - 1|$ را در $x = 1$ بررسی کنید، سپس نمودار تابع $f(x)$ و $f'(x)$ را رسم نمایید.

پاسخ: ابتدا به کمک تعیین علامت، (x) را به صورت دو ضابطه‌ای نوشت و سپس تابع (x) را می‌نویسیم:

$$f(x) = \begin{cases} -x^3 + 1 & ; -1 \leq x \leq 1 \\ x^3 - 1 & ; x > 1 \text{ یا } x < -1 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -3x^2 & ; -1 < x < 1 \\ 3x^2 & ; x > 1 \text{ یا } x < -1 \end{cases}$$



تابع f در $x = 1$ پیوسته است، بنابراین داریم: $f'_-(1) = -2$ و $f'_+(1) = 2$ می‌باشد، پس تابع در $x = 1$ مشتق‌ناپذیر و زاویه دار است. و $f'_+(1)$ را به کمک تعريف مشتق نیز می‌توانستیم بدست آوریم.

نکته: در تابع قدرمطلقی به شکل $|f(x)| = y$ ، تابع به‌ازای ریشه‌های ساده‌ی درون قدرمطلق مشتق‌ناپذیر و زاویه‌دار است.

تابع به شکل $|f(x)| = g(x)$ در ریشه‌ی ساده‌ی درون قدرمطلق زمانی مشتق‌ناپذیر هستند که به‌ازای آن تابع $g(x)$ صفر نشود. (فرض می‌کنیم $f(x)$ و $g(x)$ توابعی پیوسته باشند).

مثال: مشتق‌پذیری تابع $f(x) = [x](x-2)$ را در $x = 2$ برسی کنید. () نماد جزء صحیح می‌باشد.

پاسخ: مشتق‌های چپ و راست را به کمک تعريف بدست می‌آوریم:

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{[x](x-2) - 0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} [x] \Rightarrow \begin{cases} f'_+(2) = 2 \\ f'_-(2) = 1 \end{cases}$$

$f'_-(2) \neq f'_+(2)$ می‌باشد، بنابراین تابع در $x = 2$ مشتق‌ناپذیر و زاویه‌دار است.

نکته: در تابع به شکل کلی $[x]f(x) = (x-a)$ ، تابع در $x = a$ زاویه‌دار است.

انواع ریشه‌ها

به خاطر اهمیت موضوع، تقسیم‌بندی ریشه‌ها و تعريف آن‌ها را یادآوری می‌کنیم.

اگر تابع $f(x) = (x-a)^n$ در $x = a$ تعریف شده باشد، به شرطی که n یک عدد طبیعی و $g(a)$ مخالف صفر باشد، آن‌گاه:

۱ اگر $n = 1$ باشد، $x = a$ ریشه‌ی ساده است.

۲ اگر $n \geq 2$ باشد، $x = a$ ریشه‌ی مکر است. در این حالت اگر n فرد باشد، به آن ریشه‌ی مکر مرتبه‌ی فرد و اگر n زوج باشد، به آن ریشه‌ی

مکر مرتبه‌ی زوج گویند. اگر $n = 2$ باشد، ریشه‌ی مکر مرتبه‌ی ۲ داریم که به آن ریشه‌ی مضاعف گویند.

در حالی که تابع تجزیه شده به صورت $(x-a)^n$ باشد، تقسیم‌بندی ریشه‌ها ساده است، در غیر این حالت به تعريف کامل‌تری نیاز داریم.

تعريف ریشه‌ی ساده: در معادله‌ی $f(x) = a$ را ریشه‌ی ساده گویند، هرگاه: $f'(a) = 0$ و $f''(a)$ موجود و مخالف صفر باشد.

تعريف ریشه‌ی مضاعف (مکر مرتبه‌ی ۲): در معادله‌ی $f(x) = a$ را ریشه‌ی مضاعف گویند، هرگاه:

۱ اگر $f'(a) = 0$ و $f''(a) \neq 0$ باشد.

به همین ترتیب می‌توان ریشه‌ی مکر مرتبه‌ی ۳ و یا بالاتر را تعريف کرد.

نکته: ریشه‌های معادلات زیر جزو ریشه‌های مضاعف محاسبه می‌شوند:

$$\sin u = \pm 1, \cos u = \pm 1, \sin u + \cos u = \pm \sqrt{2}$$

(دلیل مضاعف بودن این ریشه‌ها را به کمک تعريف ریشه‌ی مضاعف و همچنین رسم نمودارشان برسی کنید).

نکته: اگر تابع $(x-a)^n$ یک چندجمله‌ای باشد، آن‌گاه تابع $[x]f(x) = g(x)$ در $x = k$ زمانی مشتق‌پذیر است که $x = k$ ریشه‌ی مکر حداقل از مرتبه‌ی ۲ برای $g(x)$ باشد. به عبارت دیگر تابع $[x]f(x) = (x-k)^n$ در $x = k$ زمانی مشتق‌پذیر است که $n \geq 2$ باشد.

تسنی: تابع $[x]f(x) = (x^3 + 3x^2 + ax + b)$ در $x = 2$ مشتق‌پذیر است، $a + b$ کدام است؟ () نماد جزء صحیح می‌باشد.

$$4(-4) - 52(2) 52(1)$$

پاسخ: با توجه به نکته‌ی بالا، $f(x) = (x^3 + 3x^2 + ax + b)$ در $x = 2$ ریشه‌ی مکر دارد. پس باید $f'(2) = 0$ باشد، بنابراین داریم: $f'(2) = 0 \Rightarrow 8 + 12 + 2a + b = 0 \Rightarrow 2a + b = -2$.

$$f'(x) = 3x^2 + 6x + a \Rightarrow f'(2) = 0 \Rightarrow 12 + 12 + a = 0 \Rightarrow a = -24 \xrightarrow{2a+b=-2} -48 + b = -2 \Rightarrow b = 28 \Rightarrow a + b = 4$$

بنابراین گزینه‌ی (۴) صحیح است.

روش به‌دست آوردن زاویه‌ی بین دو مماس چپ و راست در نقطه‌ی گوشه

فرض کنید منحنی f در $x = a$ ، نقطه‌ی گوشه داشته باشد. ابتدا مشتق چپ و راست را در $x = a$ تعیین می‌کنیم و $m_1 = f'_+(a)$ و $m_2 = f'_-(a)$ را در نظر می‌گیریم. اگر زاویه‌ی بین دو مماس چپ و راست در نقطه‌ی گوشه را با θ نشان دهیم، دو حالت برای محاسبه‌ی θ در نظر می‌گیریم:

$$\theta = \tan^{-1} \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

۱) اگر $m_1 m_2 = -1$, آن‌گاه $\theta = 90^\circ$

۲) اگر $-1 < m_1 m_2 \neq 0$, آن‌گاه زاویه‌ی حاده‌ی θ از رابطه‌ی مقابل به‌دست می‌آید:

۳) **تست:** اندازه‌ی زاویه‌ی ایجاد شده در نقطه‌ی گوشه‌ی تابع $f(x)$ کدام است؟

$\frac{\pi}{2}$ (۴)

$\frac{\pi}{6}$ (۳)

$\frac{\pi}{3}$ (۲)

$\frac{\pi}{4}$ (۱)



پاسخ: طول نقطه‌ی گوشه‌ی این تابع x^0 است، زیرا مشتق‌های چپ و راست در آن، دو عدد مختلف و متمایز می‌باشند.

$$f(x) = \begin{cases} x & ; x < 0 \\ x^2 & ; x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 1 & ; x < 0 \\ 2x & ; x > 0 \end{cases} \Rightarrow m_1 = f'_-(0) = 1, m_2 = f'_+(0) = 0.$$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \left| \frac{1-0}{1+0} \right| = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$$

پس گزینه‌ی (۱) صحیح است.

۴) **تذکر بسیار مهم:** قبل‌اً در کتاب درسی حساب دیفرانسیل و انتگرال در بحث نقطه‌ی گوشه به نیم مماس چپ و نیم مماس راست اشاره می‌شد، اما در کتاب درسی جدید، دیگر صحبت نیم مماس یا نیم خط نشده، پس هرگاه در یک نقطه‌ی گوشه بخواهیم زاویه‌ی بین مماس چپ و مماس راست را تعیین کنیم، هدف پیدا کردن زاویه‌ی حاده‌ی بین دو خط می‌باشد. (قبل‌اً پاسخ تست قبل را 135° در نظر می‌گرفتیم که دیگر با مفاهیم جدید کتاب سازگار نیست).

۵) **تست:** زاویه‌ی بین دو مماس چپ و راست بر منحنی $f(x)$ در x^0 کدام است؟

90° (۴)

60° (۳)

45° (۲)

30° (۱)


پاسخ: باید $f'_-(0)$ و $f'_+(0)$ را به‌دست آوریم. برای محاسبه‌ی $f'_-(0)$ از فرمول مشتق کمک می‌گیریم:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x}{\tan^{-1} \frac{1}{x}} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\tan^{-1} \frac{1}{x}} = \frac{1}{\pi} \tan^{-1}(-\infty) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow m_1 = -\frac{1}{2}$$

۶) **تذکر:** چون تابع $y = \frac{x}{\tan^{-1}(\frac{1}{x})}$ در x^0 تعريف نمی‌شود، برای محاسبه‌ی $f'_+(0)$ ، از تعريف مشتق استفاده کردیم.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x + 2) = 2 \Rightarrow m_2 = 2$$

چون $m_1 m_2 = -1$ ، پس زاویه‌ی بین دو مماس برابر 90° است. در نتیجه گزینه‌ی (۴) صحیح می‌باشد.



۷) **نقاط عطف قائم:** نقاطی هستند که تابع در آن‌ها پیوسته و مشتق‌های چپ و راست تابع در آن‌ها بینهایت

و هم‌علامت است. از دید هندسی در این نقاط می‌توان یک خط کامل مماس به موازات محور y را رسم کرد.


نمودار عطف قائم همواره به یکی از دو حالت مقابل می‌باشد:

در نمودار سمت چپ، تابع در همسایگی a صعودی اکید است، پس $f'(a)$ و در نمودار سمت راست، تابع

در همسایگی a نزولی اکید است، پس $f'(a)$ است.


$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^3}} \Rightarrow f'_+(0) = +\infty \text{ و } f'_-(0) = +\infty \text{ در } x^0 = 0 \text{ عطف قائم دارد، زیرا:}$$

نمودار این تابع به صورت مقابل است:



۸) **نکته:** در توابع به شکل کلی $x = a, y = \sqrt[n+1]{(x-a)^{n+1}}$ طول نقطه‌ی عطف قائم منحنی است ($n < k$ و $k, n \in \mathbb{N}$).

برای تابع $y = \sqrt[n+1]{(x-a)^{n+1}}$ در شرایط بالا اگر $x = a$ در پیوسته و مخالف صفر باشد، a طول نقطه‌ی عطف قائم منحنی است.




۹) **نقاط بازگشت:** نقاطی هستند که تابع در آن‌ها پیوسته و مشتق‌های چپ و راست تابع در آن‌ها

بینهایت و غیر هم‌علامت است. از دید هندسی در این نقاط یک مماس به موازات محور y را بر منحنی

رسم می‌شود. نمودار نقاط بازگشت همواره به یکی از دو حالت مقابل می‌باشد:

در نمودار سمت چپ، تابع در همسایگی چپ a نزولی اکید است ($f'_-(a) < 0$) و در همسایگی راست a صعودی اکید می‌باشد ($f'_+(a) > 0$). در

نمودار سمت راست، تابع در همسایگی چپ a صعودی اکید است ($f'_-(a) > 0$) و در همسایگی راست a نزولی اکید می‌باشد ($f'_+(a) < 0$).



برای مثال تابع $f(x) = \sqrt[3]{x^3}$ در $x = 0$ نقطه‌ی بازگشت دارد، زیرا: $f'_+(0) = +\infty$ و $f'_{-}(0) = -\infty$.

نمودار این تابع به صورت مقابل است:


نکته: هر نقطه‌ی بازگشت یک استرم نسبی^(۱) تابع محاسبه می‌شود.

نکته: در توابع به شکل کلی $x = a, y = \sqrt[2k+1]{(x-a)^{2n}}$ طول نقطه‌ی بازگشت منحنی است ($2n < 2k+1$, $k, n \in \mathbb{N}$).

برای تابع $y = \sqrt[2k+1]{(x-a)^{2n}}$ در شرایط بالا اگر $x = a$, $y = \sqrt[2k+1]{(x-a)^{2n}}$ پیوسته و مخالف صفر باشد نیز $x = a$ طول نقطه‌ی بازگشت است. در این حالت اگر $g(a) > 0$ باشد، در $x = a$ یک نقطه‌ی بازگشت به صورت می‌نیم و اگر $g(a) < 0$ باشد، یک نقطه‌ی بازگشت به صورت ماکزیمم خواهد داشت.

مثال: مشتق پذیری تابع $f(x) = \sqrt{|x|}$ در $x = 0$ بررسی کنید.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} ; x \geq 0 \\ \sqrt{-x} ; x < 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}} ; x > 0 \\ \frac{-1}{2\sqrt{-x}} ; x < 0 \end{cases}$$



در نتیجه $f'_+(0) = +\infty$ و $f'_{-}(0) = -\infty$ است، پس f در $x = 0$ مشتق‌پذیر است و نمودار آن به صورت نقطه‌ی بازگشت درمی‌آید:

نکته: در توابعی که به شکل کلی $y = \sqrt[n]{|x-a|}$ هستند، $x = a$ نقطه‌ی بازگشت منحنی می‌باشد ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$).

تست: برای تابع $y = \sqrt[3]{x^3 + x^2}$ نقطه‌ای به طول $x = 0$ چگونه است؟

۴) عطف قائم

۳) عطف افقی

۱) ماکزیمم نسبی


۲) می‌نیم نسبی

پاسخ: تابع را به صورت $y = \sqrt[3]{x^3 + x^2}$ می‌نویسیم. در $\sqrt[3]{x^3 + x^2}$ توان زوج و فرجه فرد است، پس $x = 0$ طول نقطه‌ی بازگشت می‌باشد.

از طرفی اگر $g(x) = \sqrt[3]{x+1}$ را در نظر بگیریم، $g(0) = 1 > 0$ است، پس $x = 0$ طول می‌نیم نسبی است.

بنابراین گزینه‌ی (۲) صحیح است.

تست: نمودار مشتق تابع $f(x) = \sqrt[3]{(x-1)^2}$ در اطراف $x = 1$ کدام گزینه است؟



پاسخ: برای رسم نمودار f' هم می‌توان از روی نمودار f آن را تشخیص داد و هم از روی مشتق‌های چپ و راست در $x = 1$.

$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x-1}} \Rightarrow f'_+(1) = +\infty, f'_{-}(1) = -\infty$

بنابراین گزینه‌ی (۳) صحیح است.

IQ به تست‌های مهم‌ترین فصل کتاب فوش اومدی. این مطلب رو هدی بگیر. آله می‌فواهی فصل مشتق را به فوبی تا آفرید بگیری، از همون ابتدا سوال‌هارو مفهومی کارکن.

$$1-1 \text{ - تابع } f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 2x + 1 & ; x > 1 \\ 6\cos(x-1) & ; x = 1 \\ 8x + 5 & ; x < 1 \end{cases} \quad \text{نحوه این تابع را در } x = 1 \text{ بررسی کنید.}$$

۱) مشتق چپ دارد - مشتق راست ندارد.

۳) مشتق چپ و راست ندارد.

۲) مشتق راست دارد - مشتق چپ ندارد.

۴) مشتق پذیر است.

$$2-2 \text{ - تابع } f(x) = \begin{cases} \sin^3 x & ; x > 0 \\ 3x & ; x = 0 \\ 3x + 1 & ; x < 0 \end{cases} \quad \text{مشتق راست دارد ولی مشتق چپ ندارد.}$$

۱) مشتق راست دارد ولی مشتق چپ ندارد.

۳) مشتق چپ دارد ولی مشتق راست ندارد.

۲) مشتق پذیر است.

۴) نه مشتق چپ دارد و نه راست.

ریاضی خارج ۹۲

۳- در تابع با ضابطه‌ی $f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{x} & ; x \geq 1 \\ x^2 + ax + b & ; x < 1 \end{cases}$ کدام است؟ $f'(x)$ ، مقدار $(1 - \sqrt{2})$ موجود است.

$3 - 2\sqrt{2}$ (۴)

$2 - 2\sqrt{2}$ (۳)

$2 - \sqrt{2}$ (۲)

$3 - \sqrt{2}$ (۱)

ریاضی خارج ۹۱

۴- اگر تابع با ضابطه‌ی $f(x) = \begin{cases} 1 + a \cos \pi x & ; x > 1 \\ bx^2 + x & ; x \leq 1 \end{cases}$ مشتق‌پذیر باشد، a کدام است؟

$\frac{1}{2}$ (۴)

-۱ (۳)

$-\frac{1}{2}$ (۲)

۱ (۱)

ریاضی داخل ۹۲

۵- تابع با ضابطه‌ی $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & ; x < 1 \\ 2\sqrt{4x-3} & ; x \geq 1 \end{cases}$ بر روی \mathbb{R} مشتق‌پذیر است. b کدام است؟

۲ (۴)

$\frac{3}{2}$ (۳)

۱ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

۶- تابع با ضابطه‌ی $f(x) = \begin{cases} \sin^2 x - \cos 2x & ; 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ a \tan x + b \sin 2x & ; \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$ مشتق‌پذیر است. b کدام است؟

۱ (۴)

$\frac{1}{2}$ (۳)

$-\frac{1}{2}$ (۲)

-۱ (۱)

ریاضی داخل ۹۱ با کمی تغییر

۷- تابع با ضابطه‌ی $f(x) = [\frac{1}{x}]$ در کدام بازه مشتق‌پذیر است؟ $[]$ نماد جزء صحیح می‌باشد.

$(-\infty, -1]$ (۴)

$[1, +\infty)$ (۳)

$(-1, 0)$ (۲)

$[0, 1]$ (۱)

۸- نمودار تابع با ضابطه‌ی $[x] + [x + \frac{1}{3}]$ روی بازه‌ی $(0, 3)$ در چند نقطه مشتق‌نای‌پذیر است؟ $[]$ نماد جزء صحیح می‌باشد.

ریاضی خارج ۸۶

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

iQ درس تامه‌رو که یادت، این سوال‌ها رو هوپیتال بگیری فیلم راهت‌تری.

۹- اگر f در a مشتق‌پذیر باشد، حاصل $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ کدام است؟

$-\frac{1}{2} f'(a)$ (۴)

$2f'(a)$ (۳)

$\frac{1}{2} f'(a)$ (۲)

$f'(a)$ (۱)

۱۰- اگر تابع f در x_0 مشتق‌پذیر و $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0) - f(x_0 - 2h)}{2h}$ ، مقدار $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ کدام است؟

$-\frac{3}{4}$ (۴)

$\frac{3}{2}$ (۳)

-۳ (۲)

۳ (۱)

۱۱- فرض کنید $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h)-1}{h}$ ، حاصل $f(x)$ کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

-۲ (۲)

-۳ (۱)

۱۲- اگر $f(x) = \begin{cases} -\sqrt{4x-3} & ; x > 1 \\ x^3 - 2x & ; x \leq 1 \end{cases}$ ، حاصل $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f'(1-h) - f'(1)}{h}$ کدام است؟

۴ (۴)

-۲ (۳)

۲ (۲)

-۴ (۱)

۱۳- در تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & ; |x| \geq 1 \\ x^2 - 3x + 6 & ; |x| < 1 \end{cases}$ چه قدر است؟

۴ (۴)

-۲ (۳)

-۱ (۲)

۵ (۱)

۱۴- با فرض $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(-1+h) - f'(-1)}{h}$ ، حاصل $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ کدام است؟

$-\frac{2}{9}$ (۴)

$\frac{2}{9}$ (۳)

$-\frac{2}{3}$ (۲)

$\frac{2}{3}$ (۱)

۱۵- اگر $f(x) = (x^2 - 4)[x]$ ، حاصل $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2-h) + f(2+h)}{2h}$ کدام است؟ $[]$ نماد جزء صحیح می‌باشد.

-۶ (۴)

-۴ (۳)

-۳ (۲)

-۲ (۱)

۱۶- اگر $f(x) = x^2 - x$ و $g(x) = \sqrt{2x}$ باشد، حاصل $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x)g(2 + \Delta x) - f(2)g(2)}{\Delta x}$ برابر کدام است؟

۷ (۴) ۶ (۳) ۴ (۲) ۳ (۱)

۱۷- مشتق تابع f در نقطه $x = 2$ به صورت $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)^2 + k(2+h) - 2k - 8}{h} = 12$ بیان شده است. k کدام است؟

۶ (۴) ۴ (۳) ۳ (۲) ۲ (۱)

۱۸- اگر $f'(x) = \cos^{-1} \frac{1}{x}$ باشد، آن‌گاه $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-3h)}{3h} = 2 \sin x$ کدام است؟

$2\sqrt{2}$ (۴) $\sqrt{2}$ (۳) $\frac{2}{3}$ (۲) ۲ (۱)

۱۹- اگر $f(x) = |x^2 - 5x + 6|$ باشد، حاصل $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(f\left(2 + \frac{1}{n^2}\right) - f(2) \right)$ کدام است؟

-۲ (۴) ۲ (۳) -۱ (۲) ۱ (۱)

۲۰- اگر $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & ; x \geq 1 \\ x^2 - x^3 & ; x < 1 \end{cases}$ باشد، حاصل $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1+h)}{h}$ کدام است؟

- ∞ (۴) $+\infty$ (۳) -۳ (۲) ۳ (۱)

این‌ها پیشتر سوال‌ها مربوط به نقاط زاویه داره، البته کتاب پدیده دیفرانسیل اسمش رو گذاشته نقاط گوشه.

۲۱- به ازای کدام مقدار a تابع با ضابطه $|x-1|+a|x-1|$ در $x=1$ مشتق‌پذیر است؟

۴) همه مقداری -1 (۳) ۲) صفر ۱ (۱)

۲۲- اگر تابع با ضابطه $|2x^2 + ax + b|$ در \mathbb{R} مشتق‌پذیر باشد، ab کدام است؟

۲۴ (۴) -۲۴ (۳) -۱۲ (۲) ۱۲ (۱)

۲۳- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} |x^2 - 1| & ; |x| \leq 2 \\ 4x - 1 & ; |x| > 2 \end{cases}$ در چند نقطه مشتق‌پذیر نیست؟

۳ (۴) ۲ (۳) ۴ (۲) ۱ (۱)

۲۴- اگر مماس چپ و مماس راست تابع با ضابطه $f(x) = |x|(x+a)$ در نقطه زاویه‌دار آن عمود بر هم باشند، مجموعه مقدار a کدام است؟

ریاضی داخل ۹۵

\emptyset (۴) $\{-1, 1\}$ (۳) $\{1\}$ (۲) $\{-1\}$ (۱)

۲۵- تابع $|x^4 - |x||$ در چند نقطه مشتق‌ناپذیر است؟

۴) صفر ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۲۶- تابع $|1 + 2\cos x|$ در چند نقطه از بازه $(-\pi, 2\pi]$ مشتق‌ناپذیر است؟

۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۲۷- تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt{1+|x|}$ در نقطه $x = \alpha$ مشتق‌ندارد. مقدار $f'_+(\alpha) - f'_{-}(\alpha)$ کدام است؟

ریاضی خارج ۸۵

۴) تعریف نشده ۱ (۳) $\frac{1}{2}$ (۲) -۱ (۱)

۲۸- اگر $f(x) = x[2x+1]$ ، مقدار $f'_+(\alpha) - f'_{-}(\alpha)$ کدام است؟ () نماد جزء صحیح است.

۴) وجود ندارد. ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۲۹- اگر $f(x) = |\sin x| \left[\cos \frac{x}{\pi} \right]$ باشد، حاصل $f'_+(\pi) - f'_{-}(\pi)$ کدام است؟ () نماد جزء صحیح است.

-۲ (۴) -۱ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۳۰- تابع $[x+1](x^2 + ax + b)$ در $x=1$ مشتق‌پذیر است، ab کدام است؟ () نماد جزء صحیح است.

-۸ (۴) ۸ (۳) -۶ (۲) ۶ (۱)

۳۱- تابع با ضابطه $f(x) = x[\sin x]$ روی بازه $(-\pi, \pi)$ کدام وضعیت را دارد؟ () نماد جزء صحیح است.

ریاضی داخل ۸۳

۴) پیوسته - مشتق‌ناپذیر ۳) ناپیوسته - مشتق‌پذیر ۲) ناپیوسته - مشتق‌پذیر ۱) پیوسته - مشتق‌پذیر