

# فصل اول

## جلسه دوم



### CHAPTER ONE



#### احتمال شرطی - متغیر تصادفی - توزیع دو جمله‌ای

##### احتمال شرطی

در بعضی مواقع ممکن است به ما اطلاعاتی بدهند که این اطلاعات در احتمال وقوع پیشامد A مؤثر باشد. به عنوان مثال، در پرتاب یک تاس احتمال وقوع عدد ۲ برابر  $\frac{1}{6}$  است. اما اگر بدانیم عدد رو شده عددی اول است، در واقع عدد ظاهر شده یکی از اعداد ۲ یا ۳ یا ۵ (۳ حالت) می‌باشد، در این صورت احتمال وقوع عدد ۲ برابر  $\frac{1}{3}$  خواهد بود.

**تعریف:** فرض کنید A و B دو پیشامد باشند، به قسمی که  $P(B) > 0$ ، در این صورت اگر B رخ داده باشد، احتمال وقوع A را که با نماد  $P(A|B)$  نشان می‌دهیم و آن را احتمال شرطی A به شرط وقوع B می‌گوییم و از دستور مقابل محاسبه می‌شود:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

و در فضای نمونه‌ای گسسته‌ی هم‌شانس داریم:

**مثال ۲۷:** اگر A و B دو پیشامد از فضای نمونه‌ای S،  $P(A \cap B) = 0/3$  و  $P(B) = 0/8$  باشند، مقدار  $P(A|B)$  را به دست آورید.

**پاسخ:** با توجه به فرمول  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$  و مقادیر  $P(A \cap B) = 0/3$  و  $P(B) = 0/8$ ، داریم:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0/3}{0/8} = \frac{3}{8}$$

**مثال ۲۸:** اگر A و B دو پیشامد از فضای نمونه‌ای S باشند به طوری که  $P(A) = 2P(B) = 0/4$  و  $P(A \cup B) = 0/5$ ، مقدار  $P(A|B)$  کدام است؟

$$0/15 \quad 0/2 \quad 0/5 \quad 0/6$$

**پاسخ:** با توجه به فرمول  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$  و مقدار  $P(B) = 0/2$ ، باید مقدار  $P(A \cap B)$  را به دست آوریم. داریم:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \rightarrow \frac{P(A)=0/4, P(B)=0/2}{P(A \cup B)=0/5} \rightarrow 0/5 = 0/4 + 0/2 - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = 0/6 - 0/5 = 0/1 \Rightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0/1}{0/2} = \frac{1}{2} = 0/5 \Rightarrow \text{گزینه (۳) صحیح است.}$$

در حل مسائل احتمال شرطی، پیشامد B (پیشامدی که می‌دانیم رخ داده است) را به عنوان فضای نمونه‌ای جدید در نظر می‌گیریم و اعضای پیشامد A را در فضای نمونه‌ای جدید مشخص می‌کنیم (در واقع  $A \cap B$ ) و سپس احتمال را در فضای نمونه‌ای جدید به دست می‌آوریم.

**مثال ۲۹:** یک تاس را دو بار پرتاب می‌کنیم. اگر مجموع اعداد رو شده کم‌تر از ۵ باشد، احتمال آن که مجموع آن‌ها برابر ۴ باشد را به دست آورید.

**پاسخ:** فرض کنیم B پیشامدی باشد که در آن مجموع اعداد رو شده کم‌تر از ۵ باشد، لذا:

$$B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1)\} \Rightarrow n(B) = 6$$

اگر A پیشامدی باشد که در آن مجموع اعداد رو شده برابر ۴ باشد، آن‌گاه:

$$A \cap B = \{(1,3), (2,2), (3,1)\} \Rightarrow n(A \cap B) = 3 \Rightarrow P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

**مثال ۳۰:** یک تاس را سه بار پرتاب می‌کنیم. اگر هر سه عدد رو شده زوج باشند، احتمال آن که هیچ‌یک از اعداد رو شده ۶ نباشند را به دست آورید.

**پاسخ:** اگر B پیشامد زوج بودن عدد رو شده در هر سه پرتاب تاس باشد، آن‌گاه در هر پرتاب عدد رو شده یکی از سه عدد زوج است و در

$$n(B) = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

نتیجه:

اگر A پیشامدی باشد که هیچ‌یک از سه عدد رو شده ۶ نباشد، آن‌گاه در هر حالت یکی از دو عدد ۲ یا ۴ رو شده است (می‌دانیم عدد رو شده زوج

$$n(A \cap B) = 2 \times 2 \times 2 = 8 \Rightarrow P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{8}{27}$$

است.) و در نتیجه:

**مثال ۳۱:** در پرتاب دو تاس، اگر حداقل یکی از اعداد رو شده ۵ باشد، با کدام احتمال عدد ۲ ظاهر شده است؟

$$\frac{1}{3} \quad (۴) \quad \frac{1}{6} \quad (۳) \quad \frac{2}{11} \quad (۲) \quad \frac{1}{11} \quad (۱)$$

**پاسخ:** اگر B پیشامد رو شدن حداقل یک بار عدد ۵ در پرتاب دو تاس باشد، آن گاه:

$$B = \{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 6)\} \Rightarrow n(B) = 11$$

$$A \cap B = \{(2, 5), (5, 2)\} \Rightarrow n(A \cap B) = 2 \Rightarrow P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{2}{11}$$

اگر A پیشامد ظاهر شدن عدد ۲ باشد، آن گاه:

بنابراین گزینه (۲) صحیح است.

**مثال ۳۲:** در یک خانواده با سه فرزند، اگر فرزند اول پسر باشد، با کدام احتمال این خانواده دقیقاً ۲ فرزند پسر دارد؟

**پاسخ:** فضای نمونه‌ای جنسیت فرزندان یک خانواده با سه فرزند، ۸ عضو دارد. اگر B پیشامدی باشد که در آن فرزند اول پسر باشد، آن گاه:

$$B = \{(پ, د, پ), (پ, د, د), (پ, پ, پ), (پ, پ, د)\} \Rightarrow n(B) = 4$$

اگر A پیشامدی باشد که در آن خانواده دقیقاً ۲ فرزند پسر داشته باشد، آن گاه:

$$A \cap B = \{(پ, د, پ), (پ, پ, د)\} \Rightarrow n(A \cap B) = 2 \Rightarrow P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

**مثال ۳۳:** کارمندان اداره‌ای مطابق جدول زیر توزیع شده‌اند. احتمال آن که کارمند مردی تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، چه قدر است؟

(مسئله‌ی کتاب درسی - صفحه‌ی ۹)

		جنسیت	
		زن	مرد
تحصیلات	دانشگاهی	۱۰	۱۵
	کم‌تر از دانشگاهی	۸۰	۹۰

**پاسخ:** با توجه به جدول  $۹۰ + ۱۵ = ۱۰۵$  کارمند اداره مرد می‌باشند که از این تعداد، ۱۵ نفر تحصیلات دانشگاهی دارند، بنابراین احتمال آن که

کارمند مرد انتخابی، تحصیلات دانشگاهی داشته باشد برابر  $P = \frac{۱۵}{۱۰۵} = \frac{۱}{۷}$  می‌باشد.

**مثال ۳۴:** از بین ۵ دانش‌آموز رشته‌ی تجربی و ۳ دانش‌آموز رشته‌ی ریاضی، سه نفر به تصادف انتخاب شده‌اند. اگر حداقل دو دانش‌آموز رشته‌ی

تجربی در بین انتخاب‌شدگان باشند، با کدام احتمال دقیقاً دو نفر از انتخاب‌شدگان از رشته‌ی تجربی می‌باشند؟

**پاسخ:** می‌دانیم از بین ۳ نفر انتخاب شده، حداقل ۲ نفر آنان از رشته‌ی تجربی هستند، بنابراین اگر B پیشامدی باشد که رخ داده باشد، آن گاه:

$$B = \{(۳, ۱), (۳, ۲)\} \Rightarrow n(B) = \binom{۵}{۲} \binom{۳}{۱} + \binom{۵}{۳} = ۱۰ \times ۳ + ۱۰ = ۴۰$$

اگر A پیشامدی باشد که در آن دقیقاً دو نفر از انتخاب‌شدگان از رشته‌ی تجربی باشند، آن گاه:

$$A \cap B = \{(۳, ۱), (۳, ۲)\} \Rightarrow n(A \cap B) = ۳ \Rightarrow P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{۳}{۴۰} = \frac{۳}{۴}$$

#### قانون ضرب احتمالات

از رابطه‌ی  $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ ، تساوی  $P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$  به دست می‌آید که به آن قانون ضرب احتمالات می‌گوییم و از این

قانون برای به دست آوردن احتمال هم‌زمان وقوع دو پیشامد استفاده می‌کنیم.

**مثال ۳۵:** درون جعبه‌ای ۴ لامپ سالم و ۱ لامپ معیوب وجود دارد. ۲ لامپ به تصادف و بدون جای‌گذاری خارج می‌کنیم. احتمال آن که لامپ اول

سالم و لامپ دوم معیوب باشد را به دست آورید.

**پاسخ:** فرض کنیم A پیشامد سالم بودن لامپ اول و B پیشامد معیوب بودن لامپ دوم باشد. می‌خواهیم  $P(A \cap B)$  را به دست آوریم. داریم:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$$

$$P(A) = \frac{۴}{۵}, \quad P(B | A) = P(\text{لامپ اول سالم} | \text{لامپ دوم معیوب}) = \frac{۱}{۴} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B | A) = \frac{۴}{۵} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۱}{۵}$$

### ← احتمال شرطی و استقلال پیشامدها

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A)$$

اگر دو پیشامد A و B مستقل از هم باشند، آن‌گاه:

در واقع، رخداد یکی از این پیشامدها در احتمال رخداد دیگری تأثیر ندارد.

**مثال ۳۶:** خانواده‌ای دارای ۴ فرزند است. اگر دو فرزند اول آن‌ها دختر باشند، با کدام احتمال هر چهار فرزند خانواده دختر می‌باشند؟


**پاسخ:** اگر دختر بودن دو فرزند اول خانواده را B و دختر بودن دو فرزند آخر خانواده را A در نظر بگیریم، آن‌گاه A مستقل از B است و داریم:

$$P(A|B) = P(A) = P(\text{فرزند سوم دختر}) \times P(\text{فرزند سوم دختر}) \times P(\text{فرزند سوم دختر}) \times P(\text{فرزند سوم دختر}) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

### ← قانون احتمال کل (احتمال‌های چندشاخه‌ای)


فرض کنید  $E_1, E_2, \dots, E_n$  پیشامدهایی باشند که حتماً یکی از آن‌ها رخ می‌دهد، یعنی  $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n = S$ . همچنین فرض کنید فقط یکی از  $E_i$ ها بتواند رخ دهد، یعنی این پیشامدها دوه‌دو ناسازگارند، یعنی به‌ازای هر  $i \neq j$ ،  $E_i \cap E_j = \emptyset$ . با این شرایط برای هر پیشامد دلخواه E داریم:

$$P(E) = P(E_1)P(E|E_1) + \dots + P(E_n)P(E|E_n) = \sum_{i=1}^n P(E_i)P(E|E_i)$$



**مثال ۳۷:** فرض کنید انتقال نوعی بیماری ارثی از والدین به فرزند پسر  $1/12$  و به فرزند دختر  $0/09$  باشد. والدینی که حامل این نوع بیماری هستند انتظار فرزندنی را دارند. مطلوب است احتمال آن‌که این فرزند سالم باشد.



(مثال کتاب درسی - صفحه ۱۱۶)



**پاسخ:** فرزندنی که به دنیا خواهد آمد یا پسر است یا دختر. پس اگر پسر بودن فرزند را با  $E_1$  و دختر بودن آن را با  $E_2$  نشان دهیم، آن‌گاه  $E_1$  و  $E_2$  ناسازگارند و حتماً یکی از آن‌ها رخ خواهد داد. سالم بودن فرزند را با E نشان می‌دهیم. می‌خواهیم  $P(E)$  را حساب کنیم.

$$P(E) = P(E_1)P(E|E_1) + P(E_2)P(E|E_2) \\ = \frac{1}{4} \times (1 - 0/12) + \frac{1}{4} \times (1 - 0/09) = 0/44 + 0/455 = 0/895$$

برای این مسأله اگر سعی می‌کردیم فهرستی از حالات ممکن تشکیل دهیم به نموداری به صورت زیر دست می‌یافتیم:



اگر روی هر یک از پاره‌خط‌های نمودار بالا احتمال پیشامد نظیر آن خط را بنویسیم، خواهیم نوشت:

حال اگر شاخه‌هایی را که به وضعیت سالم ختم می‌شوند مشخص کنیم و احتمال‌های روی آن شاخه را در هم ضرب و با نتیجه حاصل از شاخه‌های دیگر جمع کنیم، خواهیم داشت:

$$\frac{1}{4} \times 0/88 + \frac{1}{4} \times 0/91 = 0/895$$

شاخه‌ی اول      شاخه‌ی دوم

**مثال ۳۸:** احتمال پاسخ‌گویی صحیح به سؤالات اختصاصی و عمومی در یک آزمون به ترتیب  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{7}$  است. اگر از بین ۴ سؤال اختصاصی و ۸ سؤال عمومی یک سؤال به تصادف انتخاب شود، احتمال پاسخ‌گویی صحیح به این سؤال چه قدر است؟

پاسخ: اطلاعات مسأله را در نمودار درختی زیر، خلاصه می‌کنیم:

$\frac{1}{15}$  (۴)   
 سؤالات انتخابی

$\frac{2}{15}$  (۳)

$\frac{2}{5}$  (۲)

$\frac{3}{5}$  (۱)

پاسخگویی صحیح  $\xrightarrow{0/7}$  عمومی  $\frac{8}{12}$

پاسخگویی صحیح  $\xrightarrow{0/4}$  اختصاصی  $\frac{4}{12}$

بنابراین احتمال کل داریم:

$$P(\text{پاسخ‌گویی صحیح}) = \frac{8}{12} \times \frac{7}{10} + \frac{4}{12} \times \frac{4}{10} = \frac{56+16}{120} = \frac{72}{120} = \frac{3}{5}$$

بنابراین گزینه‌ی (۱) صحیح است.

**مثال ۳۹:** در یک دانشکده، ۶۰ درصد دانشجویان دختر و بقیه پسر می‌باشند. ۶۰ درصد دانشجویان دختر و ۷۰ درصد دانشجویان پسر از وام دانشجویی استفاده کرده‌اند. با کدام احتمال یک فرد انتخابی به تصادف از بین آن‌ها، از وام دانشجویی استفاده کرده است؟

پاسخ: اطلاعات مسأله را در نمودار درختی زیر خلاصه می‌کنیم:

$\frac{1}{6}$  (۴)   
 جنسیت دانشجوی

$\frac{3}{65}$  (۳)

$\frac{2}{66}$  (۲)

$\frac{1}{67}$  (۱)

دارد  $\xrightarrow{0/6}$  دختر  $\frac{1}{6}$

دارد  $\xrightarrow{0/7}$  پسر  $\frac{1}{4}$

گزینه‌ی (۴) صحیح است.  $\Rightarrow P = \frac{1}{6} \times \frac{6}{6} + \frac{1}{4} \times \frac{7}{7} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2}{6} + \frac{1.5}{6} = \frac{3.5}{6} = \frac{7}{12}$  (دانشجوی انتخابی از وام استفاده کرده باشد).

**مثال ۴۰:** درون کیسه‌ی A، ۳ کارت سفید و ۴ کارت زرد و درون کیسه‌ی B، ۲ کارت سفید و ۵ کارت سیاه وجود دارد. کاردی به تصادف از درون کیسه‌ی A انتخاب کرده و بدون نگاه کردن آن را درون کیسه‌ی B قرار می‌دهیم. سپس از کیسه‌ی B کاردی به تصادف بیرون می‌آوریم. احتمال سفید بودن کارت خارج شده از کیسه‌ی B کدام است؟

پاسخ:

$\frac{17}{56}$  (۴)

$\frac{19}{56}$  (۳)

$\frac{7}{28}$  (۲)

$\frac{5}{28}$  (۱)

سفید بودن کارت  $\xrightarrow{\frac{3}{8}}$  سفید ۳ کارت سفید / کیسه‌ی B جدید ۵ کارت سیاه

سفید بودن کارت  $\xrightarrow{\frac{2}{8}}$  زرد ۲ کارت سفید / کیسه‌ی B جدید ۵ کارت سیاه / ۱ کارت زرد

$$\Rightarrow P(\text{سفید بودن کارت}) = \frac{3}{7} \times \frac{3}{8} + \frac{4}{7} \times \frac{2}{8} = \frac{9+8}{56} = \frac{17}{56}$$

بنابراین گزینه‌ی (۴) صحیح است.

**مثال ۴۱:** ۵۵ درصد جمعیت کشوری را زنان و ۴۵ درصد بقیه را مردان تشکیل می‌دهند. اگر ۶۰ درصد زنان و ۷۰ درصد مردان باسواد باشند، مطلوب است:

(آ) احتمال آن که شخصی که به تصادف انتخاب می‌شود، باسواد باشد. (ب) اگر شخص انتخاب شده باسواد باشد، آن‌گاه احتمال آن که مرد باشد، چه قدر است؟

پاسخ: (آ) اطلاعات مسأله را در نمودار درختی زیر خلاصه می‌کنیم:

$\frac{1}{45}$  (۴)   
 وضع سواد

$\frac{3}{315}$  (۳)

$\frac{2}{66}$  (۲)

$\frac{1}{67}$  (۱)

باسواد  $\checkmark$   $\xrightarrow{0/7}$  مرد  $\frac{1}{45}$

بی‌سواد  $\xrightarrow{0/3}$  مرد  $\frac{1}{45}$

باسواد  $\checkmark$   $\xrightarrow{0/6}$  زن  $\frac{1}{55}$

بی‌سواد  $\xrightarrow{0/4}$  زن  $\frac{1}{55}$

بنابراین احتمال باسواد بودن برابر است با:

(ب) احتمال خواسته شده یک احتمال شرطی است. می‌دانیم که شخص انتخاب شده باسواد است (B)، می‌خواهیم احتمال مرد بودن وی (A) را به دست آوریم. داریم:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

طبق قسمت (آ)،  $P(B) = \frac{1}{645}$  و هم‌چنین:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{45} \times \frac{7}{7} = \frac{1}{315} \Rightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/315}{1/645} = \frac{63}{129} = \frac{21}{43}$$

## متغیر تصادفی

**تعریف:** در هر آزمایش تصادفی به هر نتیجه‌ی آزمایش، عددی را نسبت می‌دهیم. این عدد را متغیر تصادفی می‌نامیم. متغیرهای تصادفی را معمولاً با حروف بزرگ  $X$ ،  $Y$  و ... نشان می‌دهیم.

به عنوان مثال، فرض کنید در آزمایشگاهی ۵ موش سفید و ۴ موش سیاه داریم. می‌خواهیم ۳ موش از بین آن‌ها انتخاب کنیم. فرض کنید  $X$  تعداد موش‌های سفید انتخاب شده باشد، در این صورت  $X$  متغیری است تصادفی که مقادیر  $0, 1, 2, 3$  را می‌تواند انتخاب کند.  $X = 0$  (سه موش انتخاب شده سیاه باشند)،  $X = 1$  (یک موش سفید و دو موش سیاه انتخاب شوند)،  $X = 2$  (دو موش سفید و یک موش سیاه انتخاب شوند)،  $X = 3$  (هر سه موش انتخاب شده سفید باشند).

۳۵

**مثال ۴۲:** یک تاس را دو بار پرتاب می‌کنیم. اگر متغیر تصادفی  $X$ ، قدرمطلق تفاضل اعداد رو شده باشد،  $X$  چند مقدار متفاوت را اختیار می‌کند؟

$$4 \quad (1) \quad 5 \quad (2) \quad 6 \quad (3) \quad 7 \quad (4)$$

**پاسخ:** فضای نمونه‌ای این آزمایش تصادفی به صورت مقابل است:

متغیر تصادفی  $X$  به صورت  $X = |x - y|$  تعریف شده است، لذا:  
 بنابراین متغیر تصادفی  $X$ ، ۶ مقدار متفاوت را اختیار می‌کند و در نتیجه گزینه‌ی (۳) صحیح است.

## تابع توزیع احتمال و جدول توزیع احتمال

فرض کنیم جعبه‌ای ۳ مهره‌ی سفید و ۵ مهره‌ی سیاه دارد، از این جعبه چهار مهره با هم و به تصادف خارج می‌کنیم. فرض کنید  $X$  تعداد مهره‌های سفید خارج شده از جعبه باشد، در این صورت متغیر تصادفی  $X$  مقادیر  $0, 1, 2, 3$  را اختیار می‌کند (توجه کنیم  $X$  نمی‌تواند عدد ۴ را اختیار کند، زیرا درون جعبه ۴ مهره‌ی سفید وجود ندارد). احتمال هر یک از مقادیر  $X$  را به دست می‌آوریم. به عنوان مثال، احتمال آن که  $X = 0$  شود را

$$P(X = 0) = P(\text{صفر مهره سفید و چهار مهره سیاه باشند}) = \frac{\binom{3}{0} \binom{5}{4}}{\binom{8}{4}} = \frac{5}{70}$$

با  $P(X = 0)$  در نظر می‌گیریم و داریم:

$$P(X = 1) = P(\text{یک مهره سفید و سه مهره سیاه}) = \frac{\binom{3}{1} \binom{5}{3}}{\binom{8}{4}} = \frac{3 \times 10}{70} = \frac{30}{70}$$

به همین ترتیب، سایر احتمال‌ها را حساب می‌کنیم:

$$P(X = 2) = P(\text{دو مهره سفید و دو مهره سیاه}) = \frac{\binom{3}{2} \binom{5}{2}}{\binom{8}{4}} = \frac{3 \times 10}{70} = \frac{30}{70}$$

$$P(X = 3) = P(\text{سه مهره سفید و یک مهره سیاه}) = \frac{\binom{3}{3} \binom{5}{1}}{\binom{8}{4}} = \frac{1 \times 5}{70} = \frac{5}{70}$$

این احتمال‌ها را می‌توانیم در جدولی به صورت مقابل بنویسیم که به آن جدول توزیع احتمال  $X$  می‌گوییم:

همچنین احتمال‌ها از دستور زیر به دست می‌آیند که به آن تابع احتمال (تابع توزیع احتمال) می‌گوییم:

$$P(X = k) = \frac{\binom{3}{k} \binom{5}{4-k}}{\binom{8}{4}}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

بنابراین:

فرض کنیم  $S$  فضای نمونه‌ای یک آزمایش تصادفی و متغیر تصادفی  $X$  روی  $S$  مقادیر  $x_1, x_2, \dots, x_n$  را اختیار کند و هم‌چنین به ازای هر  $i$ ، احتمال آن که  $X = x_i$  شود، برابر  $P_i$  باشد در واقع:  $P(X = x_i) = P_i$ . تابع توزیع احتمال می‌گوییم. این تابع دارای دو شرط زیر است:

$$0 \leq P(X = x_i) \leq 1 \quad (1)$$

$$P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots + P(X = x_n) = 1 \quad (2)$$

(جمع احتمالات تمام مقادیر  $X$  برابر یک است).

این احتمالات را در جدول مقابل که به آن جدول توزیع احتمال  $X$  می‌گوییم، خلاصه می‌کنیم:

$X$	$x_1$	$x_2$	$\dots$	$x_n$
$P(X = x_i)$	$P_1$	$P_2$	$\dots$	$P_n$

منظور از توزیع احتمال  $X$  آن است که تعیین کنیم احتمال چگونه روی مقادیر  $X$  توزیع شده است.

**مثال ۴۳:** یک تاس سالم را دو بار پرتاب می‌کنیم. اگر متغیر تصادفی  $X$  ماکسیمم دو عدد رو شده باشد، جدول توزیع احتمال  $X$  و تابع آن را مشخص کنید.

**پاسخ:** فضای نمونه‌ای این آزمایش تصادفی به صورت  $S = \{(x, y) \mid x, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$  است و داریم:

$$X = \max\{x, y\} = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$P(X=1) = P(\{(1,1)\}) = \frac{1}{36}, \quad P(X=2) = P(\{(1,2), (2,1), (2,2)\}) = \frac{3}{36}$$

احتمال هر یک از مقادیر  $X$  را به دست می‌آوریم:

$$P(X=3) = P(\{(1,3), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}) = \frac{5}{36}$$

$$P(X=4) = P(\{(1,4), (2,4), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\}) = \frac{7}{36}$$

$$P(X=5) = P(\{(1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5)\}) = \frac{9}{36}$$

$$P(X=6) = P(\{(1,6), (2,6), (3,6), (4,6), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}) = \frac{11}{36}$$

$X$	۱	۲	۳	۴	۵	۶
$P(X)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

جدول توزیع احتمال  $X$  به صورت مقابل است:

با توجه به احتمال‌های به دست آمده (صورت کسرها، اعداد فرد می‌باشند)، تابع احتمال به صورت  $P(X=k) = \frac{2k-1}{36}, k=1, 2, 3, 4, 5, 6$  می‌باشد.

**مثال ۴۴:** از بین ۴ دانش آموز رشته‌ی ریاضی و ۵ دانش آموز رشته‌ی تجربی، ۳ نفر را به تصادف انتخاب می‌کنیم. اگر متغیر تصادفی  $X$ ، تعداد دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی انتخاب شده باشد، مقدار  $P(X \leq 1)$  کدام است؟

$$\frac{23}{42} \quad (۴) \qquad \frac{19}{42} \quad (۳) \qquad \frac{17}{42} \quad (۲) \qquad \frac{13}{42} \quad (۱)$$

**پاسخ:**  $X = 0, 1, 2, 3$  = تعداد دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی انتخاب شده از بین ۳ دانش‌آموز انتخاب شده

(یکی از رشته‌ی تجربی و ۲ نفر از رشته‌ی ریاضی باشند).  $+P$  (هر سه دانش‌آموز از رشته‌ی ریاضی باشند).  $\Rightarrow P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) =$

$$= \frac{\binom{5}{0} \binom{4}{3}}{\binom{9}{3}} + \frac{\binom{5}{1} \binom{4}{2}}{\binom{9}{3}} = \frac{4}{84} + \frac{30}{84} = \frac{34}{84} = \frac{17}{42}$$

بنابراین گزینه‌ی (۲) صحیح است.

**مثال ۴۵:** تابع احتمال به صورت  $P(X=x) = \frac{2^x}{A}; x=1, 2, 3, 4, 5, 6$  تعریف شده است. با محاسبه‌ی عدد  $A$ ، احتمال فرد بودن متغیر تصادفی  $X$ ، کدام است؟

(سراسری ریاضی خارج از کشور)

$$\frac{1}{2} \quad (۱) \qquad \frac{1}{3} \quad (۲) \qquad \frac{3}{7} \quad (۳) \qquad \frac{1}{2} \quad (۴)$$

**پاسخ:** در تابع احتمال، مجموع احتمالات برابر یک است. ابتدا با قرار دادن مقادیر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ به جای  $x$  در تابع، هر یک از احتمالات را به دست می‌آوریم:

$X$	۱	۲	۳	۴	۵	۶
$P(X)$	$\frac{2}{A}$	$\frac{4}{A}$	$\frac{8}{A}$	$\frac{16}{A}$	$\frac{32}{A}$	$\frac{64}{A}$

$$P(X=1) + P(X=2) + \dots + P(X=6) = 1 \Rightarrow \frac{2}{A} + \frac{4}{A} + \frac{8}{A} + \frac{16}{A} + \frac{32}{A} + \frac{64}{A} = 1 \Rightarrow \frac{2+4+8+16+32+64}{A} = 1 \Rightarrow A = 126$$

$$P(X \text{ فرد باشد}) = P(X=1) + P(X=3) + P(X=5) = \frac{2}{126} + \frac{8}{126} + \frac{32}{126} = \frac{42}{126} = \frac{1}{3}$$

بنابراین گزینه‌ی (۲) صحیح است.

## توزیع دوجمله‌ای و احتمال آن

۱) هر آزمایش که دو نتیجه داشته باشد را یک امتحان می‌گوییم. به عنوان مثال، لامپی که به‌طور تصادفی انتخاب شود یا سالم است یا خراب. نتیجه‌ای از این آزمایش که موردنظر ما است را «پیروزی» و دیگری را «شکست» می‌نامیم. به عنوان مثال، اگر یک تاس را پرتاب کنیم و بخوایم احتمال آمدن عدد زوج را به‌دست آوریم، در این‌صورت آمدن عدد زوج، پیروزی و آمدن عددی غیر زوج (فرد)، شکست می‌باشد.

**نکته:** اگر احتمال پیروزی برابر  $p$  باشد، در این‌صورت احتمال شکست برابر  $1-p$  است. به عنوان مثال اگر احتمال برنده شدن یک نفر در مسابقه‌ای،  $0/7$  باشد، در این‌صورت احتمال شکست وی در این مسابقه برابر  $0/3 = 1 - 0/7$  است.

۲) هر امتحان را  $n$  بار تکرار می‌کنیم. به عنوان مثال، سکه‌ای را  $10$  بار پرتاب می‌کنیم.

۳) آزمایش‌ها به‌صورت مستقل تکرار می‌شود. به عنوان مثال، احتمال «رو» آمدن سکه در پرتاب اول برابر  $1/2$  است. در هر یک از پرتاب‌های دیگر نیز احتمال «رو» آمدن برابر  $1/2$  است. بنابراین اگر  $p$  احتمال پیروزی در انجام یک بار آزمایش باشد، آن‌گاه  $p$  در طول آزمایش ثابت است و از آزمایشی به آزمایشی دیگر عوض نمی‌شود.

اگر متغیر تصادفی  $X$  را تعداد پیروزی‌ها در  $n$  بار تکرار آزمایش‌ها در نظر بگیریم، آن‌گاه  $X$  مقادیر  $0, 1, 2, \dots, n$  را اختیار می‌کند و احتمال از دستور مقابل پیروی می‌کند:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

توجه کنیم که:

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + \dots + P(X = n) = 1$$

هر متغیر تصادفی که به‌صورت بالا معرفی می‌شود دارای توزیعی است که آن توزیع را **توزیع دوجمله‌ای** می‌نامیم.

**مثال ۴۶:** نوعی بذر ذرت تهیه شده است که ادعا می‌شود  $90\%$  بذرها جوانه خواهند زد. اگر  $20$  دانه از این ذرت‌ها را در شرایط مناسب و یکسان بکاریم، مطلوب است تعیین توزیع تعداد بذرهایی که جوانه می‌زنند و محاسبه‌ی احتمال آن که فقط  $18$  دانه جوانه بزند (جواب را ساده نکنید). (تمرین کتاب درسی - صفحه ۱۹)

**پاسخ:** هر بذری که کاشته می‌شود، یا جوانه می‌زند (پیروزی) و یا جوانه نمی‌زند (شکست). احتمال پیروزی برای هر بذر برابر  $0/9 = 90\%$  و در نتیجه احتمال شکست برای هر بذر،  $0/1 = 10\%$  است. این آزمایش برای  $n = 20$  بذر تکرار شده است و این تکرارها مستقل از هم می‌باشند.

$X = 0, 1, 2, \dots, 20$  تعداد بذرهایی جوانه زده از  $20$  بذر کاشته شده

بنابر احتمال دوجمله‌ای داریم:

$$P(X = k) = \binom{20}{k} (0/9)^k (1-0/9)^{20-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, 20$$

$$P(X = 18) = \binom{20}{18} (0/9)^{18} (0/1)^2$$

**مثال ۴۷:** دانش‌آموزی به  $5$  پرسش سه‌گزینه‌ای، به تصادف پاسخ می‌دهد. احتمال این‌که حداکثر به یک پرسش پاسخ درست بدهد، کدام است؟

$$(1) \frac{107}{243} \quad (2) \frac{110}{243} \quad (3) \frac{112}{243} \quad (4) \frac{119}{243}$$

**پاسخ:** احتمال پاسخ‌گویی صحیح به هر سؤال تستی سه‌گزینه‌ای برابر  $p = 1/3$  است. اگر متغیر تصادفی  $X$  تعداد پاسخ‌گویی صحیح به  $5$  سؤال باشد، آن‌گاه:

می‌خواهیم  $P(X \leq 1)$  را به‌دست آوریم. بنابر احتمال دوجمله‌ای، داریم:

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \binom{5}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^5 + \binom{5}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^4 = \frac{32}{243} + \frac{80}{243} = \frac{112}{243}$$

بنابراین گزینه‌ی (۳) صحیح است.

**مثال ۴۸:** اگر در یک خانواده با سه فرزند احتمال به دنیا آمدن فرزند دختر  $0/6$  و پسر  $0/4$  باشد، احتمال آن‌که دقیقاً دو فرزند از سه فرزند این خانواده دختر باشند، کدام است؟

$$(1) 0/348 \quad (2) 0/432 \quad (3) 0/484 \quad (4) 0/512$$

**پاسخ:** با توجه به احتمال دوجمله‌ای، داریم:

$$\Rightarrow P(X = 2) = \binom{3}{2} (0/6)^2 (1-0/6)^{3-2} = 0/432$$

بنابراین گزینه‌ی (۲) صحیح است.

**مثال ۴۹:** ۲۰٪ افراد یک جامعه به بیماری A مبتلا هستند. اگر سه نفر به تصادف از این جامعه انتخاب شوند، احتمال آن که دو نفر مبتلا به بیماری و یک نفر نباشد، چند برابر این است که هر سه مبتلا باشند؟

(آزاد)

- (۱) ۱۲ (۲) ۱۶ (۳) ۶۴ (۴) ۴

**پاسخ:** احتمال آن که فردی که به تصادف انتخاب می‌شود مبتلا به بیماری A باشد برابر  $p = 0/2$  است. اگر  $X$  تعداد افراد مبتلا به بیماری A باشد، بنابراین احتمال دوجمله‌ای، داریم:


$$\frac{P(X=2)}{P(X=3)} = \frac{\binom{3}{2} (0/2)^2 (1-0/2)^1}{\binom{3}{3} (0/2)^3} = \frac{3 \times \frac{1}{8}}{\frac{1}{8}} = 3$$

بنابراین گزینه‌ی (۱) صحیح است.

**مثال ۵۰:** هشتاد درصد از دانشجویان دانشگاهی بومی‌اند. می‌دانیم ۲۰ درصد از دانشجویان بومی و غیربومی متأهل می‌باشند. اگر به تصادف ۴ نفر از بین آن‌ها انتخاب کنیم، با کدام احتمال ۳ نفر آنان، متأهل می‌باشند؟

- (۱) ۰/۰۲۵۶ (۲) ۰/۰۲۸۴ (۳) ۰/۰۳۱۲ (۴) ۰/۰۳۲۴

**پاسخ:** ابتدا احتمال متأهل بودن یک دانشجوی انتخابی را به دست می‌آوریم: (احتمال چند شاخه‌ای)



$$P(\text{متأهل بودن دانشجوی}) = 0/8 \times 0/2 + 0/2 \times 0/2 = 0/2 \times (0/8 + 0/2) = 0/2$$

بنابراین احتمال دوجمله‌ای، داریم:  $P(X=3) = \binom{4}{3} (0/2)^3 (1-0/2)^1 = 0/0/256$

بنابراین گزینه‌ی (۱) صحیح است.

حالت خاص احتمال دوجمله‌ای

اگر احتمال پیروزی در یک آزمایش برابر  $\frac{1}{p}$  باشد (رو یا پشت آمدن در پرتاب سکه، پسر یا دختر بودن فرزند و ...)، آن‌گاه فرمول احتمال

$$P(X=k) = \frac{\binom{n}{k}}{p^n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

دوجمله‌ای به صورت مقابل می‌باشد:

**مثال ۵۱:** در یک خانواده‌ی ۴ فرزند، با کدام احتمال ۳ فرزند پسر است؟

- (۱)  $\frac{1}{16}$  (۲)  $\frac{1}{8}$  (۳)  $\frac{3}{16}$  (۴)  $\frac{1}{4}$

**پاسخ:** احتمال پسر بودن هر فرزند برابر  $p = \frac{1}{2}$  است، لذا بنا بر حالت خاص احتمال دوجمله‌ای، اگر  $X$  تعداد فرزندان پسر خانواده باشد، آن‌گاه:

$$P(X=3) = \frac{\binom{4}{3}}{2^4} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

بنابراین گزینه‌ی (۴) صحیح است.



## تست‌های جلسه دوم



۸۷. در پرتاب دو تاس، اگر هر دو عدد رو شده اول باشند، با کدام احتمال مجموع آن‌ها نیز عددی اول است؟

$$(1) \frac{4}{9} \quad (2) \frac{5}{9} \quad (3) \frac{2}{3} \quad (4) \frac{7}{9}$$

۸۸. در پرتاب دو تاس با هم، می‌دانیم جمع دو عدد رو شده کم‌تر از ۱۰ است. با کدام احتمال هر دو عدد رو شده، فرد هستند؟ (سراسری ریاضی)

$$(1) \frac{4}{15} \quad (2) \frac{2}{9} \quad (3) \frac{1}{5} \quad (4) \frac{1}{4}$$

۸۹. یک خانواده‌ی سه فرزند با کدام احتمال، سه فرزند پسر دارد، در صورتی‌که می‌دانیم فرزند اول آن‌ها پسر است؟

$$(1) \frac{1}{2} \quad (2) \frac{1}{4} \quad (3) \frac{2}{3} \quad (4) \frac{3}{4}$$

۹۰. خانواده‌ای دارای ۴ فرزند است. می‌دانیم که دو فرزند اول آن‌ها پسر است. احتمال آن‌که دو فرزند دیگر این خانواده دختر باشند، کدام است؟ (سراسری تجربی)

$$(1) \frac{3}{16} \quad (2) \frac{1}{4} \quad (3) \frac{5}{16} \quad (4) \frac{3}{8}$$

۹۱. دانشجویان دانشکده‌ای مطابق جدول زیر توزیع شده‌اند. احتمال آن‌که دانشجوی زنی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل باشد، کدام است؟

		جنسیت		
		زن	مرد	
مقطع تحصیلی	کارشناسی ارشد	۱۵	۲۵	$\frac{5}{8}$ (۲)
	دکتر	۵	۱۵	$\frac{3}{8}$ (۴)

۹۲. ارقام ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ را به تصادف کنار هم قرار می‌دهیم. اگر عدد حاصل زوج باشد، احتمال آن‌که دو رقم یکسان کنار هم باشند، کدام است؟

$$(1) \frac{1}{4} \quad (2) \frac{1}{3} \quad (3) \frac{2}{5} \quad (4) \frac{3}{5}$$

۹۳. درون کیسه‌ای ۴ مهره‌ی سفید با شماره‌های ۱ تا ۴ و ۳ مهره‌ی سیاه با شماره‌های ۱ تا ۳ قرار دارند. از این کیسه دو مهره به ترتیب و بدون جای‌گذاری خارج می‌کنیم. اگر حداقل یکی از مهره‌ها سفید و با شماره‌ی ۲ باشد، با کدام احتمال مجموع شماره‌های دو مهره برابر ۴ است؟

$$(1) \frac{1}{8} \quad (2) \frac{1}{12} \quad (3) \frac{1}{6} \quad (4) \frac{1}{4}$$

۹۴. درون کیسه‌ای ۵ گوی سفید و ۴ گوی سیاه یکسان قرار دارند. از این کیسه دو گوی پی‌درپی و با جای‌گذاری خارج می‌کنیم. اگر دو گوی خارج شده هم‌رنگ باشند، با کدام احتمال سفید می‌باشند؟

$$(1) \frac{16}{41} \quad (2) \frac{25}{41} \quad (3) \frac{3}{8} \quad (4) \frac{5}{8}$$

۹۵. در محفظه‌ای ۳ موش سالم و ۴ موش دیابتی وجود دارند. از این محفظه ۳ موش گریخته‌اند، اگر موش اول سالم باشد، آن‌گاه با کدام احتمال هر سه موش سالم می‌باشند؟

$$(1) \frac{8}{15} \quad (2) \frac{4}{15} \quad (3) \frac{2}{15} \quad (4) \frac{1}{15}$$

۹۶. شخصی به تصادف به ۳ سؤال از ۱۰ سؤال پاسخ داده است. اگر این شخص به سؤال اول پاسخ داده باشد، با کدام احتمال این شخص دقیقاً به دو سؤال با شماره‌ی فرد پاسخ داده است؟

$$(1) \frac{11}{36} \quad (2) \frac{5}{18} \quad (3) \frac{5}{9} \quad (4) \frac{4}{9}$$

۹۷. اگر داشته باشیم  $P(A) = 0/5$ ،  $P(A \cup B) = 0/6$  و  $P(B) = 0/2$ ، آن‌گاه کدام گزینه درست است؟ (آزاد)

$$(1) A \text{ و } B \text{ ناسازگارند.} \quad (2) P(A|B) = \frac{1}{3} \quad (3) P(B|A) = \frac{2}{3} \quad (4) A \text{ و } B \text{ مستقل هستند.}$$

۹۸. اگر  $A$  و  $B$  دو پیشامد از فضای نمونه‌ای  $S$  باشند، به طوری‌که  $P(A) = 0/3$ ،  $P(B) = 0/4$  و  $P(A|B) = 0/6$ ، آن‌گاه  $P(B|A)$  کدام است؟

$$(1) \frac{4}{5} \quad (2) \frac{3}{5} \quad (3) \frac{2}{3} \quad (4) \frac{1}{3}$$

۹۹. احتمال انتقال نوعی بیماری ارثی از والدین به فرزند پسر، ۱۰ درصد و به فرزند دختر ۶ درصد است. با کدام احتمال، فرزندی که به دنیا می‌آید، این نوع بیماری را ندارد؟ (سراسری تجربی)

- ۰/۹۱ (۱)      ۰/۹۲ (۲)      ۰/۹۳ (۳)      ۰/۹۴ (۴)

۱۰۰. در آزمون ورودی دانشگاه، درصد شرکت‌کنندگان سه رشته‌ی تجربی، ریاضی و انسانی به ترتیب ۵۰، ۲۵ و ۲۵ می‌باشد. هم‌چنین درصد شرکت‌کنندگان دختر در سه رشته به ترتیب ۶۰، ۴۰ و ۴۰ می‌باشند. اگر یک نفر به تصادف از بین آن‌ها انتخاب شود، با کدام احتمال دختر می‌باشد؟

- ۰/۴۵ (۱)      ۰/۵ (۲)      ۰/۵۲ (۳)      ۰/۵۶ (۴)

۱۰۱. در اداره‌ای تعداد کارمندان مرد، سه برابر تعداد کارمندان زن است. ۸۰ درصد کارمندان مرد و ۳۰ درصد کارمندان زن دارای مدرک کارشناسی هستند. اگر یک کارمند به تصادف از بین آن‌ها انتخاب شود، با کدام احتمال دارای مدرک کارشناسی است؟

- $\frac{۲۷}{۴۰}$  (۱)       $\frac{۲۹}{۴۰}$  (۲)       $\frac{۲۷}{۲۰۰}$  (۳)       $\frac{۲۹}{۲۰۰}$  (۴)

۱۰۲. در یک خانواده، احتمال داشتن گروه خونی A برای فرزند پسر ۳/۰ و برای فرزند دختر ۴/۰ است. اگر این خانواده دو فرزند داشته باشد، احتمال آن‌ها که گروه خونی هر دو فرزند از نوع A باشد، کدام است؟

- ۰/۴۷ (۱)       $\frac{۴۷}{۴۰۰}$  (۲)       $\frac{۴۹}{۴۰۰}$  (۳)      ۰/۴۹ (۴)

۱۰۳. سه ظرف همانند داریم. در اولی و دومی هر کدام ۵ مهره‌ی سفید و ۳ مهره‌ی سیاه و در ظرف سوم ۴ مهره‌ی سفید و ۶ مهره‌ی سیاه است. اگر به تصادف یک ظرف انتخاب و یک مهره بیرون آوریم، با کدام احتمال این مهره سیاه است؟ (سراسری ریاضی خارج از کشور)

- $\frac{۹}{۲۰}$  (۱)       $\frac{۱۱}{۲۰}$  (۲)       $\frac{۱۳}{۴۰}$  (۳)       $\frac{۱۷}{۴۰}$  (۴)

۱۰۴. دو ظرف یکسان داریم. ظرف اول شامل ۲ مهره‌ی سفید و ۴ مهره‌ی سیاه و ظرف دوم شامل ۵ مهره‌ی سفید و یک مهره‌ی سیاه است. چند مهره‌ی سفید به ظرف اول اضافه کنیم تا در برداشتن یک مهره به‌طور تصادفی از یکی از ظرف‌ها احتمال سفید بودن مهره برابر  $\frac{۲۵}{۳۶}$  باشد؟

- ۳ (۱)      ۴ (۲)      ۵ (۳)      ۶ (۴)

۱۰۵. دو ظرف داریم. در اولی ۵ مهره‌ی سفید و ۴ مهره‌ی سیاه، در دومی ۷ مهره‌ی سفید و ۱۰ مهره‌ی سیاه است. از ظرف اول یک مهره برداشته و بدون رؤیت در ظرف دوم قرار می‌دهیم. آن‌گاه از ظرف دوم یک مهره بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟ (سراسری ریاضی)

- $\frac{۸}{۲۷}$  (۱)       $\frac{۱۱}{۲۷}$  (۲)       $\frac{۳۴}{۸۱}$  (۳)       $\frac{۴۱}{۸۱}$  (۴)

۱۰۶. یک تاس را پرتاب می‌کنیم. اگر عدد حاصل مضرب ۳ باشد، دو سکه را با هم و در غیر این‌صورت سه سکه را با هم پرتاب می‌کنیم. احتمال آن‌که دقیقاً ۲ بار «رو» ظاهر شود، چه قدر است؟

- $\frac{۱}{۵}$  (۱)       $\frac{۲}{۳}$  (۲)       $\frac{۱}{۲}$  (۳)       $\frac{۱}{۳}$  (۴)

۱۰۷. ۹۵ درصد متهمینی که به یک دادگاه آورده می‌شوند گناهکار می‌باشند. اگر در ۹۸ درصد مواقع هیئت منصفه تشخیص درست بدهد و یک نفر از متهمین را به تصادف از بین آن‌ها انتخاب کنیم، با کدام احتمال گناهکار است؟

- ۰/۹۱۲ (۱)      ۰/۹۳۲ (۲)      ۰/۲۳۸ (۳)      ۰/۹۴۶ (۴)

۱۰۸. در یک جامعه‌ی روستایی، ۶۰ درصد جمعیت آن را مردان و ۴۰ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند. می‌دانیم ۸۰ درصد مردان و ۳۰ درصد زنان به کار کشاورزی مشغول می‌باشند. اگر یک نفر از این جامعه به تصادف انتخاب کنیم و مشغول کار کشاورزی باشد، با کدام احتمال زن می‌باشد؟

- $\frac{۲}{۵}$  (۱)       $\frac{۱}{۵}$  (۲)       $\frac{۱}{۶}$  (۳)       $\frac{۱}{۳}$  (۴)

۱۰۹. جدول توزیع احتمال متغیر تصادفی X به‌صورت مقابل است. مقدار  $P(X \leq ۲)$  کدام است؟

X	۱	۲	۳	۴
P(X)	$\frac{۱}{۴}$	$\frac{a}{۲}$	$\frac{a}{۳}$	$\frac{۱}{۸}$

- $\frac{۷}{۱۲}$  (۱)       $\frac{۵}{۱۲}$  (۲)       $\frac{۳}{۸}$  (۳)       $\frac{۵}{۸}$  (۴)

۱۱۰. یک تاسی را دو بار پرتاب می‌کنیم. اگر متغیر تصادفی X مجموع اعداد رو شده باشد، مقدار  $P(X = ۶)$  کدام است؟

- $\frac{۵}{۳۶}$  (۱)       $\frac{۱}{۶}$  (۲)       $\frac{۷}{۳۶}$  (۳)       $\frac{۲}{۹}$  (۴)

۱۱۱. درون کیسه‌ای ۳ کارت یکسان با شماره‌های ۱، ۲ و ۳ قرار دارد. کارت‌ها را یکی یکی و با جای‌گذاری خارج می‌کنیم. اگر متغیر تصادفی  $X$  تعداد دفعات خارج کردن کارت‌ها باشد تا اولین کارت با شماره‌ی زوج خارج شود، مقدار  $P(X=3)$  کدام است؟

$$(1) \frac{2}{27} \quad (2) \frac{4}{27} \quad (3) \frac{1}{3} \quad (4) \frac{8}{27}$$

۱۱۲. از بین ۱۰ لامپ که ۴ تای آن‌ها معیوب است، دو لامپ به تصادف انتخاب می‌کنیم. اگر متغیر تصادفی  $X$  تعداد لامپ‌های معیوب انتخاب شده باشد،  $P(X \geq 1)$  چه قدر است؟

$$(1) \frac{2}{3} \quad (2) \frac{1}{2} \quad (3) \frac{3}{4} \quad (4) \frac{4}{5}$$

۱۱۳. در پرتاب دو تاس با هم، اگر متغیر تصادفی  $X$  برابر مجموع دو عدد ظاهر شده با تابع احتمال  $P(X=x) = a - \frac{|x-7|}{36}$  باشد،  $a$  کدام است؟

(سراسری ریاضی)

$$(1) \frac{1}{9} \quad (2) \frac{1}{3} \quad (3) \frac{1}{4} \quad (4) \frac{1}{6}$$

۱۱۴. در تابع احتمال  $x = 1, 2, 3, 4, 5$  و  $P(X=x) = kx^2$ ، مقدار  $P(X \geq 4)$  کدام است؟

$$(1) \frac{43}{55} \quad (2) \frac{41}{55} \quad (3) \frac{39}{50} \quad (4) \frac{37}{50}$$

۱۱۵. اگر تابع احتمال متغیر تصادفی  $X$  به صورت  $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$  و  $P(X=x) = \binom{5}{x} \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{5-x}$  باشد، مقدار  $P(X \geq 2)$  کدام است؟

$$(1) \frac{137}{243} \quad (2) \frac{131}{243} \quad (3) \frac{112}{243} \quad (4) \frac{107}{243}$$

۱۱۶. از نوعی بذر ۸۰ درصد آن‌ها جوانه می‌زند. اگر سه بذر از این نوع کاشته شود، با کدام احتمال لااقل دو بذر جوانه می‌زند؟

(سراسری تجربی)

$$(1) 0.512 \quad (2) 0.784 \quad (3) 0.864 \quad (4) 0.896$$

۱۱۷. رنگ چشم ۸۰ درصد از اهالی منطقه‌ای میشی است. اگر ۵ نفر به تصادف از این جمعیت انتخاب شود، با کدام احتمال فقط رنگ چشم ۲ نفر از آنان میشی است؟

$$(1) 0.1024 \quad (2) 0.0512 \quad (3) 0.0512 \quad (4) 0.1024$$

۱۱۸. دانش‌آموزی به ۵ پرسش چهارگزینه‌ای به تصادف پاسخ می‌دهد. با کدام احتمال فقط به سه پرسش پاسخ صحیح داده است؟

$$(1) \frac{57}{512} \quad (2) \frac{51}{512} \quad (3) \frac{49}{512} \quad (4) \frac{45}{512}$$

۱۱۹. در یک خانواده احتمال تولد فرزند پسر، سه برابر احتمال تولد فرزند دختر است. احتمال آن‌که فقط دو فرزند از سه فرزند این خانواده پسر باشند، کدام است؟

$$(1) \frac{9}{64} \quad (2) \frac{27}{64} \quad (3) \frac{4}{9} \quad (4) \frac{4}{27}$$

۱۲۰. پدر و مادری هر یک دارای یک زن رنگ چشم مغلوب ( $b$ ) و یک زن رنگ چشم غالب ( $B$ ) اند و  $P(B) = 2P(b)$ . اگر این پدر و مادر دارای ۴ فرزند باشند، با کدام احتمال دقیقاً یک فرزند از فرزندان دارای زن رنگ چشم مغلوب است؟

$$(1) \frac{32}{81} \quad (2) \frac{35}{81} \quad (3) \frac{11}{27} \quad (4) \frac{19}{27}$$

۱۲۱. نوعی واکسن با احتمال ۹۰ درصد برای طیور تأثیر مثبت دارد. اگر ۵ مورد از این واکسن به کار رود، با کدام احتمال، فقط ۳ مورد آن تأثیر مثبت خواهد داشت؟

(سراسری تجربی)

$$(1) 0.729 \quad (2) 0.81 \quad (3) 0.729 \quad (4) 0.81$$

۱۲۲. ۷۵ درصد تیرهای یک تیرانداز به هدف اصابت می‌کند. اگر این شخص ۴ تیر پرتاب کند، احتمال آن‌که حداقل ۳ تیر به هدف اصابت کند، کدام است؟

$$(1) \frac{189}{256} \quad (2) \frac{191}{256} \quad (3) \frac{193}{256} \quad (4) \frac{195}{256}$$

۱۲۳. احتمال دیر رسیدن شخصی به محل کار ۱/۰ است. احتمال آن‌که این شخص در ۴ روز کاری، حداقل در سه روز به موقع سر کار حاضر شود، چه قدر است؟

$$(1) 0.9158 \quad (2) 0.9241 \quad (3) 0.9382 \quad (4) 0.9477$$

۱۲۴. اگر ۴۰ درصد زن‌های تعیین‌کننده‌ی عامل RH خون منفی باشند، احتمال آن‌که از بین ۳ نفر حداقل ۲ نفر RH خون منفی داشته باشند، کدام است؟  
 (۱)  $\frac{1}{2}$  (۲)  $\frac{2}{3}$  (۳)  $\frac{3}{4}$  (۴)  $\frac{4}{5}$

۱۲۵. ۴۰٪ جمعیت جامعه‌ای تحصیلات دانشگاهی دارند و ۹۰٪ افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند و ۴۰٪ افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی روزنامه می‌خوانند. اگر سه نفر از بین آن‌ها به تصادف انتخاب کنیم، احتمال آن‌که دقیقاً دو نفر آن‌ان روزنامه مطالعه کنند، چه قدر است؟  
 (۱)  $\frac{1}{3}$  (۲)  $\frac{2}{3}$  (۳)  $\frac{4}{5}$  (۴)  $\frac{5}{6}$

۱۲۶. در پرتاب ۴ سکه‌ی سالم با هم، احتمال این‌که فقط سه سکه «رو» یا فقط سه سکه «پشت» بیاید، کدام است؟ (سراسری ریاضی)  
 (۱)  $\frac{5}{16}$  (۲)  $\frac{7}{16}$  (۳)  $\frac{2}{3}$  (۴)  $\frac{1}{2}$

۱۲۷. خانواده‌ی A سه فرزند و خانواده‌ی B دو فرزند دارند. با کدام احتمال تعداد پسرهای A زوج و تعداد دخترهای B فرد است؟ (آزمون‌های گاج)  
 (۱)  $\frac{1}{4}$  (۲)  $\frac{1}{3}$  (۳)  $\frac{1}{2}$  (۴)  $\frac{3}{8}$

۱۲۸. اگر احتمال باریدن برف در یک روز برابر  $\frac{1}{4}$  باشد، احتمال آن‌که از ۵ روز، دقیقاً در سه روز برف نیارد، کدام است؟  
 (۱)  $\frac{9}{16}$  (۲)  $\frac{7}{16}$  (۳)  $\frac{3}{8}$  (۴)  $\frac{5}{16}$

۱۲۹. تاس سالمی را ۱۰ بار می‌ریزیم. احتمال آن‌که ۶ بار برآمد تاس، عددی بزرگ‌تر از ۳ باشد، کدام است؟ (سراسری ریاضی)  
 (۱)  $\frac{63}{256}$  (۲)  $\frac{75}{256}$  (۳)  $\frac{75}{512}$  (۴)  $\frac{105}{512}$

## تست‌های کنکور

۱۳۰. در پرتاب یک تاس، اگر عدد زوج ظاهر شود، یک تیرانداز مجاز است ۴ تیر رها کند. در غیر این‌صورت ۳ تیر رها می‌کند. می‌دانیم احتمال موفقیت در هر تیر رها شده  $\frac{2}{3}$  است. با کدام احتمال، فقط ۲ بار موفقیت حاصل می‌شود؟ (سراسری تجربی- ۹۴)  
 (۱)  $\frac{8}{27}$  (۲)  $\frac{10}{27}$  (۳)  $\frac{11}{27}$  (۴)  $\frac{13}{27}$

۱۳۱. در پرتاب یک سکه، اگر «رو» بیاید یک تیرانداز مجاز است ۵ تیر رها کند، اگر «پشت» بیاید، ۳ تیر رها می‌کند. می‌دانیم احتمال اصابت هر تیر رها شده  $\frac{2}{5}$  است. با کدام احتمال فقط یک تیر اصابت می‌کند؟ (سراسری تجربی فارغ از کشور- ۹۴)  
 (۱)  $\frac{96}{625}$  (۲)  $\frac{114}{625}$  (۳)  $\frac{122}{625}$  (۴)  $\frac{128}{625}$

۱۳۲. ظرف A دارای ۴ مهره‌ی سفید و ۵ مهره‌ی سیاه است و هر یک از دو ظرف یکسان B و C دارای ۶ مهره‌ی سفید و ۳ مهره‌ی سیاه است. به تصادف یکی از سه ظرف را انتخاب کرده و ۴ مهره از آن خارج می‌کنیم. با کدام احتمال دو مهره از مهره‌های خارج شده، سفید است؟ (سراسری تجربی- ۹۳)  
 (۱)  $\frac{25}{63}$  (۲)  $\frac{26}{63}$  (۳)  $\frac{10}{21}$  (۴)  $\frac{11}{21}$

۱۳۳. احتمال انتقال نوعی بیماری مسری به افراد مستعد برابر  $\frac{1}{2}$  است. اگر ۵ نفر مستعد، با فردی که حامل این بیماری است ملاقات کنند، با کدام احتمال ۳ نفر آنان مبتلا می‌شوند؟ (سراسری تجربی- ۹۳)  
 (۱)  $\frac{1}{256}$  (۲)  $\frac{512}{5}$  (۳)  $\frac{1024}{1}$  (۴)  $\frac{2048}{2}$

۱۳۴. شصت درصد از کارکنان سازمانی مرد و چهل درصد آنان زن هستند. می‌دانیم که ۲۰ درصد از مردان و ۴۵ درصد از زنان تحصیلات دانشگاهی دارند. اگر به تصادف ۳ نفر از بین آنان انتخاب شود، با کدام احتمال ۲ نفر آنان، تحصیلات دانشگاهی دارند؟ (سراسری تجربی فارغ از کشور- ۹۳)  
 (۱)  $\frac{1}{189}$  (۲)  $\frac{1}{192}$  (۳)  $\frac{1}{196}$  (۴)  $\frac{1}{198}$

۱۳۵. دانش‌آموزی به ۵ پرسش ۵ گزینه‌ای به تصادف پاسخ می‌دهد. با کدام احتمال فقط به سه پرسش پاسخ صحیح داده است؟ (سراسری تجربی- ۹۲)  
 (۱)  $\frac{1}{256}$  (۲)  $\frac{512}{5}$  (۳)  $\frac{625}{1}$  (۴)  $\frac{768}{2}$

۱۳۶. در جعبه‌ی اول ۴ مهره‌ی سفید و ۳ مهره‌ی سیاه و در جعبه‌ی دوم ۳ مهره‌ی سفید و ۶ مهره‌ی سیاه موجود است. به تصادف یکی از جعبه‌ها را انتخاب نموده و دو مهره با هم و به تصادف از آن بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال هر دو مهره سفید است؟ (سراسری تجربی خارج از کشور- ۹۲)

$$(۱) \frac{۳۱}{۱۶۸} \quad (۲) \frac{۱۱}{۵۶} \quad (۳) \frac{۱۷}{۸۴} \quad (۴) \frac{۱۳}{۵۶}$$

۱۳۷. دانش‌آموزی به ۵ پرسش ۵ گزینه‌ای به تصادف پاسخ می‌دهد. با کدام احتمال فقط به یک پرسش پاسخ صحیح داده است؟

(سراسری تجربی خارج از کشور- ۹۲)

$$(۱) \frac{۰}{۲۰۴۸} \quad (۲) \frac{۰}{۴۰۹۶} \quad (۳) \frac{۰}{۵۱۲} \quad (۴) \frac{۰}{۷۱۴۴}$$

۱۳۸. در آزمایشگاهی ۶ موش سیاه و ۴ موش سفید موجود است. به‌طور تصادفی ۲ موش از بین آن‌ها خارج می‌کنیم.  $X$  تعداد موش‌های سفید خارج شده است. بیش‌ترین مقدار در توزیع احتمال آن کدام است؟ (سراسری تجربی- ۹۱)

$$(۱) \frac{۲}{۵} \quad (۲) \frac{۷}{۱۵} \quad (۳) \frac{۸}{۱۵} \quad (۴) \frac{۳}{۵}$$

۱۳۹. دو تاس سالم را با هم پرتاب می‌کنیم تا برای اولین بار هر دو عدد رو شده زوج باشند. با کدام احتمال حداکثر در سه پرتاب نتیجه حاصل می‌شود؟ (سراسری تجربی- ۹۱)

$$(۱) \frac{۲۷}{۶۴} \quad (۲) \frac{۳۷}{۶۴} \quad (۳) \frac{۱۹}{۳۲} \quad (۴) \frac{۳۹}{۶۴}$$

۱۴۰. احتمال انتقال نوعی بیماری از فرد بیمار به افراد مستعد  $\frac{۰}{۲}$  است. اگر ۶ نفر مستعد با این بیمار ملاقات کنند، با کدام احتمال ۴ نفر آنان به این بیماری مبتلا می‌شوند؟ (سراسری تجربی خارج از کشور- ۹۱)

$$(۱) \frac{۰}{۱۴۲۸} \quad (۲) \frac{۰}{۱۵۳۶} \quad (۳) \frac{۰}{۱۵۴۸} \quad (۴) \frac{۰}{۱۵۹۶}$$

۱۴۱. در یک روستا ۵۴ درصد جمعیت را مردان و ۴۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. اگر ۶۰ درصد مردان و ۷۵ درصد زنان دقت‌رچه‌ی سلامت داشته باشند، با کدام احتمال یک فرد انتخابی به تصادف از بین آن‌ها، دقت‌رچه‌ی سلامت دارد؟ (سراسری تجربی خارج از کشور- ۹۰)

$$(۱) \frac{۰}{۶۵۸} \quad (۲) \frac{۰}{۶۶۹} \quad (۳) \frac{۰}{۶۸۵} \quad (۴) \frac{۰}{۶۹۶}$$

۱۴۲. به‌طور متوسط از هر ۱۰ مشتری مراجعه‌کننده به فروشگاه، ۶ نفر خرید می‌کنند. در فاصله‌ی زمانی معین، ۴ مشتری به این فروشگاه مراجعه می‌کنند. با کدام احتمال فقط ۳ نفر از آنان خرید می‌کنند؟ (سراسری تجربی خارج از کشور- ۹۰)

$$(۱) \frac{۰}{۳۱۷۲} \quad (۲) \frac{۰}{۳۲۸۲} \quad (۳) \frac{۰}{۳۴۵۶} \quad (۴) \frac{۰}{۳۶۵۴}$$

۱۴۳. احتمال انتقال بیماری مسری به افرادی که واکسن زده‌اند  $\frac{۰}{۲۵}$  و احتمال انتقال به افراد دیگر  $\frac{۰}{۲}$  است.  $\frac{۲}{۵}$  کارگران یک کارگاه واکسن زده‌اند. اگر فرد حامل بیماری به تصادف با یکی از کارگران ملاقات کند، با کدام احتمال، این بیماری منتقل می‌شود؟ (سراسری تجربی- ۸۹)

$$(۱) \frac{۰}{۱۳} \quad (۲) \frac{۰}{۱۴} \quad (۳) \frac{۰}{۱۵} \quad (۴) \frac{۰}{۱۶}$$

۱۴۴. از نوعی بذر که ۸۰ درصد آنان جوانه می‌زند، ۵ عدد کاشته شده است. با کدام احتمال، حداقل دو عدد از آن‌ها جوانه می‌زند؟ (سراسری تجربی- ۸۹)

$$(۱) \frac{۰}{۹۹۳۲۸} \quad (۲) \frac{۰}{۹۹۳۶۰} \quad (۳) \frac{۰}{۹۴۲۰۸} \quad (۴) \frac{۰}{۹۵۱۲۰}$$

۱۴۵. در یک خانواده‌ی سه فرزندی، می‌دانیم یکی از فرزندان پسر است. با کدام احتمال دو فرزند دیگر دختر است؟ (سراسری تجربی خارج از کشور- ۸۹)

$$(۱) \frac{۳}{۸} \quad (۲) \frac{۳}{۷} \quad (۳) \frac{۴}{۷} \quad (۴) \frac{۵}{۸}$$

۱۴۶. در یک کارخانه، ۶۰ درصد کارگران بومی‌اند. اگر ۴ نفر از بین آن‌ها به تصادف انتخاب شوند، با کدام احتمال درست ۳ نفر از آن‌ها بومی‌اند؟

(سراسری تجربی خارج از کشور- ۸۹)

$$(۱) \frac{۰}{۱۵۳۶} \quad (۲) \frac{۰}{۲۹۸۶} \quad (۳) \frac{۰}{۳۲۷۶} \quad (۴) \frac{۰}{۳۴۵۶}$$

۱۴۷. دانش‌آموزی به ۶ پرسش تستی سه‌گزینه‌ای، به تصادف پاسخ می‌گوید. احتمال این‌که فقط به ۴ پرسش پاسخ درست بدهد، کدام است؟

$$(۱) \frac{۴}{۸۱} \quad (۲) \frac{۵}{۸۱} \quad (۳) \frac{۱۶}{۲۴۳} \quad (۴) \frac{۲۰}{۲۴۳}$$

۱۴۸. ۵۵ درصد دانشجویان سال اول، دختر و بقیه پسر هستند. ۶۰ درصد دختران و ۶۴ درصد پسران تمام واحدهای درسی خود را گذرانده‌اند. چند درصد کل دانشجویان، تمام واحدهای درسی را گذرانده‌اند؟ (سراسری تجربی خارج از کشور- ۸۸)

$$(۱) \frac{۶۱}{۴} \quad (۲) \frac{۶۱}{۸} \quad (۳) \frac{۶۲}{۴} \quad (۴) \frac{۶۲}{۸}$$

۱۴۹. در یک خانواده‌ی سه فرزندی، می‌دانیم فرزند اول آن‌ها دختر است. با کدام احتمال لاقل یکی از فرزندان پسر است؟ (سراسری تیربی- ۸۷)

$$(1) \frac{1}{3} \quad (2) \frac{1}{2} \quad (3) \frac{5}{8} \quad (4) \frac{3}{4}$$

۱۵۰. احتمال انتقال و بروسه‌ی، از فرد بیمار به افراد مستعد  $\frac{1}{10}$  است. اگر این بیمار با ۴ فرد مستعد ملاقات کند، با کدام احتمال ۲ یا ۳ نفر آن‌ها مبتلا می‌شوند؟ (سراسری تیربی- ۸۷)

$$(1) \frac{0.482}{10} \quad (2) \frac{0.522}{10} \quad (3) \frac{0.564}{10} \quad (4) \frac{0.594}{10}$$

۱۵۱. یک خانواده‌ی سه فرزندی با کدام احتمال، حداقل دو فرزند دختر دارد، در صورتی‌که می‌دانیم حداقل یکی از فرزندان دختر است؟ (سراسری تیربی خارج از کشور- ۸۷)

$$(1) \frac{3}{8} \quad (2) \frac{5}{8} \quad (3) \frac{3}{7} \quad (4) \frac{4}{7}$$

۱۵۲. هفتاد و پنج درصد محصولات کارخانه‌ای مرغوب‌اند. با کدام احتمال از ۴ کالای خریداری شده‌ی این کارخانه لاقل یک کالا مرغوب است؟ (سراسری تیربی خارج از کشور- ۸۷)

$$(1) \frac{251}{256} \quad (2) \frac{255}{256} \quad (3) \frac{127}{128} \quad (4) \frac{63}{64}$$

۱۵۳. پدر و مادری هر یک دارای یک ژن رنگ چشم مغلوب (b) و یک ژن رنگ چشم غالب (B) هستند و  $P(B) = 3P(b)$ . اگر این پدر و مادر دارای ۳ فرزند باشند، با کدام احتمال فقط یکی از فرزندان دارای ژن رنگ چشم مغلوب است؟ (سراسری تیربی خارج از کشور- ۸۶)

$$(1) \frac{9}{64} \quad (2) \frac{9}{32} \quad (3) \frac{27}{64} \quad (4) \frac{9}{16}$$

۱۵۴. آزمایشی فقط دو نتیجه‌ی شکست و پیروزی دارد. احتمال پیروزی  $\frac{3}{4}$  است و X تعداد پیروزی‌ها در ۱۶ بار تکرار این آزمایش‌ها است.  $P(0 \leq X \leq 16)$  کدام است؟ (سراسری تیربی- ۸۵)

$$(1) \left(\frac{3}{4}\right)^{16} \quad (2) 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{16} \quad (3) 2 \left(\frac{16}{8}\right) \left(\frac{3}{4}\right)^8 \quad (4) 1$$

۱۵۵. در یک خانواده‌ی دو فرزندی، می‌دانیم یکی از فرزندان پسر است. با کدام احتمال، این خانواده دارای فرزند دختر است؟ (سراسری تیربی خارج از کشور- ۸۵)

$$(1) \frac{1}{3} \quad (2) \frac{1}{2} \quad (3) \frac{2}{3} \quad (4) \frac{3}{4}$$

۱۵۶. در یک شرکت ۴۵۰ نفر کار می‌کنند که ۳۰۰ نفر آن‌ها تحصیلات دانشگاهی دارند. اگر ۶ نفر از این کارکنان به تصادف انتخاب شوند، با کدام احتمال ۴ نفر آن‌ها تحصیلات دانشگاهی دارند؟ (سراسری تیربی خارج از کشور- ۸۵)

$$(1) \frac{16}{81} \quad (2) \frac{64}{243} \quad (3) \frac{80}{243} \quad (4) \frac{40}{81}$$

۱۵۷. در دو ظرف به ترتیب ۲۴ و ۱۸ مهره‌ی یکسان موجود است. در ظرف اول ۶ مهره سفید و در ظرف دوم ۳ مهره سفید است. از اولی ۷ مهره و از دومی ۵ مهره به تصادف برداشته و در ظرف دیگری می‌ریزیم. سپس از ظرف آخر یک مهره بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟ (سراسری ریاضی- ۹۴)

$$(1) \frac{13}{72} \quad (2) \frac{7}{36} \quad (3) \frac{15}{72} \quad (4) \frac{31}{144}$$

۱۵۸. در یک شرکت تولیدی، ۵۵ درصد کالا محصول دستگاه A با احتمال ۳ درصد معیوب، و ۴۵ درصد آن محصول دستگاه B با احتمال ۵ درصد معیوب است. دو دستگاه مستقل از هم هستند. اگر یک کالا را به‌طور تصادفی انتخاب کنیم و بدانیم که معیوب است، با کدام احتمال این کالا محصول دستگاه A است؟ (سراسری ریاضی خارج از کشور- ۹۴)

$$(1) \frac{11}{26} \quad (2) \frac{6}{13} \quad (3) \frac{7}{13} \quad (4) \frac{15}{26}$$

۱۵۹. یک سکه را پرتاب می‌کنیم. اگر «رو» بیاید آن‌گاه تاس می‌ریزیم. اگر «پشت» بیاید دوباره سکه را پرتاب می‌کنیم. این عمل را آن‌قدر ادامه می‌دهیم تا مجاز به پرتاب تاس باشیم. با کدام احتمال، حداکثر بعد از پرتاب سوم سکه، عدد تاس مضرب ۳ می‌باشد؟ (سراسری ریاضی خارج از کشور- ۹۴)

$$(1) \frac{1}{6} \quad (2) \frac{1}{4} \quad (3) \frac{7}{24} \quad (4) \frac{5}{12}$$

۱۶۰. در جعبه‌ای ۳ مهره سفید و ۴ مهره سیاه موجود است. ۲ مهره بدون رؤیت از جعبه خارج می‌کنیم. سپس از بین باقی‌مانده‌ی مهره‌ها، به تصادف یک مهره بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟

(سراسری ریاضی فارغ از کشور- ۹۳)

$$\frac{5}{14} \quad (1) \quad \frac{3}{7} \quad (2) \quad \frac{4}{7} \quad (3) \quad \frac{9}{7} \quad (4)$$

۱۶۱. پنج مهره سفید با شماره‌های ۱ تا ۵ و هم‌چنین ۵ مهره سیاه با شماره‌های ۱ تا ۵ و یکسان را در ظرفی قرار می‌دهیم. به تصادف دو مهره از بین آن‌ها بیرون می‌آوریم. اگر مجموع شماره‌های هر دو مهره ۶ باشد، با کدام احتمال، هر دو مهره هم‌رنگ هستند؟

(سراسری ریاضی- ۹۲)

$$\frac{2}{5} \quad (1) \quad \frac{4}{9} \quad (2) \quad \frac{5}{9} \quad (3) \quad \frac{3}{5} \quad (4)$$

۱۶۲. دو تاس همگن را انداخته‌ایم. اگر حاصل جمع شماره‌های رو شده کم‌تر از ۶ باشد، احتمال آن که حداقل شماره‌ی یکی از تاس‌های رو شده ۲ باشد، کدام است؟

(سراسری ریاضی- ۹۱)

$$\frac{1}{2} \quad (1) \quad \frac{2}{5} \quad (2) \quad \frac{1}{3} \quad (3) \quad \frac{3}{5} \quad (4)$$

۱۶۳. تاس همگنی را با چشم بسته انداخته‌ایم و فقط می‌دانیم که برآمد عدد زوج است. احتمال این که شماره‌ی ۴ یا ۶ ظاهر شده باشد، کدام است؟

(سراسری ریاضی فارغ از کشور- ۹۱)

$$\frac{1}{2} \quad (1) \quad \frac{1}{3} \quad (2) \quad \frac{2}{3} \quad (3) \quad \frac{3}{4} \quad (4)$$

۱۶۴. در جعبه‌ای ۲ مهره سیاه و ۳ مهره سفید یکسان وجود دارد. به تصادف ۱ مهره از جعبه خارج و رنگ آن را یادداشت می‌کنیم و به جعبه برمی‌گردانیم، اگر  $X$  تعداد آزمایش‌هایی باشد که برای اولین بار مهره سفید خارج شود،  $P(X \leq 3)$  کدام است؟

(سراسری ریاضی فارغ از کشور- ۹۰)

$$\frac{21}{25} \quad (1) \quad \frac{117}{125} \quad (2) \quad \frac{119}{125} \quad (3) \quad \frac{24}{25} \quad (4)$$

۱۶۵. در دو جعبه به ترتیب ۲۴ و ۱۵ عدد لامپ یکسان موجود است. در جعبه‌ی اول ۴ عدد و در جعبه‌ی دوم ۳ عدد لامپ معیوب‌اند. از اولی ۸ لامپ و از دومی ۶ لامپ به تصادف برداشته و در یک جعبه‌ی جدید قرار می‌دهیم. با کدام احتمال یک لامپ انتخابی از جعبه‌ی جدید معیوب است؟

(سراسری ریاضی- ۸۹)

$$\frac{17}{105} \quad (1) \quad \frac{19}{105} \quad (2) \quad \frac{6}{35} \quad (3) \quad \frac{8}{35} \quad (4)$$

۱۶۶. سکه‌ای را پرتاب می‌کنیم. اگر «رو» بیاید تاس را می‌ریزیم، اگر «پشت» بیاید، سه سکه‌ی دیگری را با هم می‌ریزیم. در این آزمایش، احتمال این که دقیقاً یک سکه «رو» ظاهر شود، کدام است؟

(سراسری ریاضی- ۸۹)

$$\frac{3}{4} \quad (1) \quad \frac{9}{16} \quad (2) \quad \frac{5}{8} \quad (3) \quad \frac{11}{16} \quad (4)$$

۱۶۷. در یک شرکت بسته‌بندی کالا، درصد محصولات تولیدی، با سه دستگاه  $A$ ،  $B$  و  $C$  به ترتیب ۳۰، ۴۵ و ۲۵ می‌باشد. می‌دانیم ۱ درصد از محصولات  $A$ ، ۲ درصد از محصولات  $B$  و ۴ درصد از محصولات  $C$  معیوب هستند. اگر یک کالا به تصادف از بین این محصولات انتخاب کنیم، احتمال سالم بودن آن کدام است؟

(سراسری ریاضی فارغ از کشور- ۸۹)

$$\frac{1}{975} \quad (1) \quad \frac{2}{978} \quad (2) \quad \frac{3}{982} \quad (3) \quad \frac{4}{987} \quad (4)$$

۱۶۸. تابع احتمال متغیر تصادفی  $X$  به صورت  $P(X=i) = \frac{i(i+1)}{a}$ ،  $i=1,2,3,4,5$  است. مقدار  $P(X=5)$  کدام است؟

(سراسری ریاضی فارغ از کشور- ۸۷)

$$\frac{3}{7} \quad (1) \quad \frac{4}{9} \quad (2) \quad \frac{5}{11} \quad (3) \quad \frac{4}{7} \quad (4)$$

۱۶۹. یک تاس همگن را انداخته‌ایم. برآمد حاصل، مضرب ۳ نیست. احتمال آن که شماره‌ی ظاهر شده ۲ باشد کدام است؟

(سراسری ریاضی- ۸۶)

$$\frac{1}{6} \quad (1) \quad \frac{1}{5} \quad (2) \quad \frac{1}{4} \quad (3) \quad \frac{1}{3} \quad (4)$$

۱۷۰. تابع احتمال متغیر تصادفی  $X$  به صورت  $P(X=i) = \frac{\binom{5}{i}}{a}$ ،  $i=1,2,3,4,5$  است. مقدار  $P(X \geq 4)$  کدام است؟

(سراسری ریاضی فارغ از کشور- ۸۵)

$$\frac{1}{8} \quad (1) \quad \frac{5}{31} \quad (2) \quad \frac{3}{16} \quad (3) \quad \frac{6}{31} \quad (4)$$